

Л. МАРТИНО.

ОНАНИЗМЪ, САФИЗМЪ И СОДОМІЯ

У

ЖЕНЩИНЪ.

Лекціи, читанныя въ госпиталѣ Lourcine и собранныя
патерномъ М. Logrand'омъ.

Переводъ съ французскаго изданія 1884 года.

И. В. Жарновскаго.

Нижній-Новгородъ.
Типографія М. Г. Гилевой.
1884.

Л.

ОБЩЕСТВО

ЖЕ

Лекції, читан

Першо

Л. МАРТИНО.

ОНАНИЗМЪ, САФИЗМЪ И СОДОМІЯ

У

ЖЕНЩИНЪ.

Лекціи, читанныя въ госпиталѣ Lourcine и собранныя
интерномъ М. Lormand'омъ.

Переводъ съ французскаго изданія 1884 года.

И. В. Жарновскаго.

Нижній-Новгородъ.
Типографія М. Г. Гилевой.
1884.

Дозволено цензурою. Москва. 1884 года, Мая 25 дня.

Въ
воснален
страдані
ное вни

Н
измѣне
измом

Сира
вижу
случ
физ

не
пр
он

н
і
:

О Г Л А В Л Е Н І Е.

	СТРАН.
Введеніе	1
Причины вульварныхъ и заднепроходныхъ измѣненій .	5
Причины сафизма	9
Анатомія наружн. женск. половыхъ органовъ . .	16
Измѣненія половой щели отъ онанизма	23
Клиническія свойства этихъ измѣненій	25
Измѣненія полов. органовъ женщины отъ рукоблудія .	26
Клиническія явленія при онанизмѣ бедрами . .	28
— — сафизма.	30
Поврежденія вслѣдствіе сафизма	32
Общія явленія при онанизмѣ	—
Какъ помогать при онанизмѣ	34
Измѣненія половой щели отъ растленія	36
Этіологическія условія	39
Клиническое свойство измѣненій	41
Признаки проституціи	43
Измѣненія задняго прохода отъ содоміи	48
Причины	—
Клиническія явленія	59
Содомія свѣжая	64
— привычная	66
Діагностика содоміи	74
Послѣдствія содоміи	76
Заключеніе.	—

Мм. 12.

Въ прошломъ году мы разсматривали терапію сифилиса и воспаленій матки. Теперь я намѣренъ перейти къ обзорѣннѣю страданій половой щели и влагалища, а также обратить особенное вниманіе на бѣли у женщинъ.

Но прежде этого. я желалъ-бы привлечь ваше вниманіе на измѣненія половой щели и задняго прохода, производимыя онанизмомъ, сафизмомъ, растленіемъ и содоміей.

Къ чему это изученіе?

Оно необходимо:

1) Потому. что измѣненія этихъ органовъ очень часты. Справившись со статистикой больныхъ въ моемъ отдѣленіи, я вижу, что съ 1880 года на 1770 наблюденій приходится 500 случаевъ съ измѣненіями вульвы или ануса отъ онанизма, сафизма, содоміи.

2) Потому, что эти измѣненія весьма важны для судебной медицины. Всякій экспертъ обязанъ быть хорошо ознакомленъ съ признаками на половыхъ органахъ отъ растленія, сафизма, или онанизма, съ измѣненіями задняго прохода отъ содоміи.

Но предметъ этотъ интересуетъ не одну судебную медицину: всякій врачъ при госпитальной и частной практикѣ встрѣчаетъ нередко случаи къ примѣненію своихъ клиническихъ знаній по этому поводу.

3) Потому, что изученіе этихъ измѣненій ведетъ врача къ познанію тѣхъ физическихъ способовъ, которыми онѣ производятся и объясняетъ ему причины многихъ половыхъ и заднепродныхъ поврежденій. Такимъ образомъ, разныя воспаленія, ссадины, язвы, ушибы вульвы и похотника, извѣстныя воспаленія Бартолиновыхъ желѣзъ—находятъ свое объясненіе въ мастурбациі, сафизмѣ, растленіи. Съ другой стороны, нѣкоторыя воспаленія, разрывы, изъязвленія задняго прохода—происходятъ отъ содоміи. Въ измѣненіяхъ же вульвы и ануса врачъ находитъ объясненіе тѣмъ нервнымъ и пищеварительнымъ расстройствамъ, которыя никогда не замедляютъ явиться, если вышеозначенные акты часто совершаются.

Не настаивая пока на изображеніи расстройствъ умственныхъ и нравственныхъ, доходящихъ до ипохондріи, самоубійства и даже до преступленій; не упоминая о периферическихъ нервныхъ расстройствахъ, каковы анестезія, гиперэстезія и двигательные параличи; желая доказать только, что я нисколько не утрирую, говоря о послѣдствіяхъ этихъ актовъ,—я приведу случай больной, которая вслѣдствіе содомскаго грѣха, совершаемаго надъ нею ея мужемъ, получала то полную, то не полную параллелію послѣ cadaго противуестественнаго акта. Фактъ этотъ, къ которому мы еще возвратимся впослѣдствіи, сообщенъ мнѣ однимъ изъ моихъ уважаемыхъ товарищей, докторомъ Бернаромъ. (de Cannes).

4) Наконецъ, потому, что это изученіе позволяетъ врачу въ очень многихъ случаяхъ распознать у дѣвицы, или у женщины—причину конституціональнаго метрита, оцѣнить значеніе возвратовъ, рецидивовъ метрита, и такимъ образомъ привлечь вниманіе больныхъ на источникъ происхожденія болѣзни и на причины замедляющія излеченіе. Не проходитъ недѣли, чтобы я не указывалъ вамъ, при своихъ клиническихъ чтеніяхъ, на воз-

враты, на обостренія метритовъ и адено-лимфитовъ отъ онанизма, которому предаются больныя въ этихъ палатахъ. И у кокотокъ, и у замужнихъ женщинъ. и въ частной практикѣ, многое множество разъ мнѣ приходилось наблюдать эти явленія, и вамъ тоже придется, если вы познакомитесь съ клиническимъ характеромъ вульварныхъ измѣненій, о которыхъ идетъ рѣчь. Слѣдовательно, много есть причинъ, дѣлающихъ изученіе половыхъ и заднепроходныхъ измѣненій крайне важнымъ для врача.

Въ 1880 году я впервые обратилъ вниманіе медицинскаго міра на нѣкоторыя изъ измѣненій половой щели и спеціально на тѣ, что обуславливаются сифизмомъ. Я еще не былъ окончательно убѣжденъ въ клиническомъ значеніи измѣненій и потому съ большою осторожностію описывалъ замѣченные мною признаки.

Съ этаго времени, изучая внимательнѣе измѣненія вульварныя и заднепроходныя, слѣдующія за сифизмомъ, онанизмомъ, растленіемъ и содомскимъ грѣхомъ, я имѣлъ возможность убѣдиться въ дѣйствительности и въ постоянствѣ раньше описанныхъ признаковъ. Я узналъ, что нѣкоторые изъ нихъ бываютъ сильнѣе выражены, чѣмъ я прежде это предполагалъ.

Я открылъ нѣкоторые другіе признаки, столь-же характеристическіе, какъ и прежніе. Вотъ одна изъ причинъ, заставляющихъ меня возобновить съ вами въ нынѣшнемъ году это изученіе, которое, какъ я твердо надѣюсь, будетъ для васъ крайне полезно.

Измѣненія половой щели и задняго прохода зависятъ частію отъ патологическихъ, частію же отъ физическихъ причинъ. Первыя вытекаютъ изъ настоящаго, или прежняго болѣзненнаго состоянія половой щели, или задняго прохода; вторыя обязаны своимъ происхожденіемъ физической причинѣ, зависящей отъ

физиологическихъ отравленій органовъ, или отъ порочныхъ привычекъ, или отъ противуестественныхъ половыхъ сношеній. Мы не станемъ разсматривать первыхъ: они состоятъ изъ отековъ, склерозовъ, изъязвленій, рубцовъ, варикозныхъ расширеній, гипертрофій; они вытекаютъ изъ пороковъ или задержки развитія: таковъ гермафродитизмъ. Вторыя послужатъ предметомъ нашего изученія.

Измѣненія половой щели отъ порочныхъ привычекъ, зависятъ или отъ тренія похотника пальцемъ, инороднымъ тѣломъ, половымъ членомъ: это *похотниковый онанизмъ*; или отъ сосанія и тренія клитора и penis'а языкомъ—это *сафизмъ*. Измѣненія задняго прохода производится противуестественнымъ совокупленіемъ, это *содомія* у женщинъ и *педерастія* у мужчинъ. Наконецъ, измѣненія половой щели вызывается совокупленіемъ, будетъ ли оно добровольно, или насильственно, законно или преступно. Сюда относится изученіе половыхъ измѣненій вызванныхъ проституціей, изнасилованіемъ и растленіемъ.

Дѣйствія, производящія измѣненія половой щели и задняго прохода были извѣстны и практиковались съ глубочайшей древности.

Онанизмъ, сафизмъ и содомія существовали всегда. Я не намѣренъ изучать исторически этотъ предметъ, считая это тѣмъ болѣе лишнимъ, что мы имѣемъ превосходный трудъ моего друга, доктора Moreau de Tours подъ заглавіемъ: „*Sur les aberrations du sens gènésique*“. Достаточно будетъ напомнимъ вамъ преданія Содома и Гоморры; а также законы, которые Ликургъ и Солонъ, Зенонъ и Аристиппъ принуждены были издавать, для обузданія ненормальныхъ половыхъ инстинктовъ своихъ согражданъ. Достаточно упомянуть о знаменитыхъ оргіяхъ двѣнадцати Цезарей объ императорахъ и императрицахъ римскихъ, отмѣтить первыми

и демономаническія эпидеміи среднихъ вѣковъ, равно какъ и сатурналіи регентства и царствованія Людовика XV-го, чтобы доказать вамъ, что эти развратные акты давно уже занимали моралистовъ. А нынѣ, когда мы не присутствуемъ уже публично на оргіяхъ, на сатурналіяхъ, о которыхъ было упомянуто—не надо думать, чтобы противуестественные акты, (содомія), порочныя привычки, (сафизмъ и онанизмъ), торговля своимъ тѣломъ (проституція) — стали менѣе частыми: если вы вспомните только многочисленные факты, на которые я ежедневно обращалъ ваше вниманіе, статистика которыхъ такъ заботливо велась моимъ интерномъ, М. Logman'омъ;—то вы уже въ состояніи будете достаточно оцѣнить ихъ частоту. А я, чѣмъ болѣе наблюдаю, тѣмъ болѣе смущаюсь громадными размѣрами половыхъ страстей.

Не одинъ госпиталь, и частная практика указываетъ мнѣ на зло, наводняющее понемногу всѣ классы общества. Не только у проституттокъ зарегистрированныхъ и свободныхъ замѣчалъ я характеристичныя для сафизма или для содоміи измѣненія; я находилъ ихъ и у замужней женщины, безспорное доказательство, что эти развратные акты умножаются со дня на день.

Чему-же, Мм. Гг., приписать это ужасающее прогрессируваніе половыхъ инстинктовъ, возбуждающихъ до такой степени отдѣльныхъ лицъ, что послѣдніе для удовлетворенія своихъ страстей не отступаютъ ни передъ насиліемъ, ни передъ звѣрствомъ, ни передъ самоубійствомъ, ни передъ преступленіемъ?

Говоря такъ, я намекаю на множество примѣровъ содоміи и сафизма, собранныхъ или въ госпиталѣ, или въ частной практикѣ. Я намекаю на документы, на письма отъ содомистокъ, отъ предающихся трибадіи и тому под. Надобно прочесть эти письма, изображающія сильнѣйшую любовь, крайнюю ревность и самую бѣшенную страсть, чтобы понять тѣ волненія, которыя

испытываютъ порочные субъекты, узнавъ, что ихъ противуестественная любовь обманута; повторяю, надобно ихъ прочесть, чтобы убѣдиться, что я не преувеличиваю, говоря: самоубійства и всякія преступленія часто служатъ финаломъ этихъ пагубныхъ и постыдныхъ страстей. Я не стану сообщать вамъ нынѣ этихъ фактовъ, предполагая обнародовать нѣкоторые изъ нихъ въ моемъ трудѣ о проституціи, имѣющемъ выйти въ концѣ этого года.

Въ теченіи этихъ лекцій я приведу вамъ только примѣры бѣшенства, насилія, звѣрства, которые не трудно наблюдать при сафизмѣ и содоміи; а именно, я укажу вамъ на тяжелыя поврежденія задняго прохода и похотника, произведенныя во время акта содоміи и сафизма.

Но, Мм. Гг., и не представляя вамъ упомянутыхъ документовъ, я могу воспользоваться ими для ознакомленія васъ съ нѣкоторыми причинами, способствующими развитію и распространенію этихъ противуестественныхъ актовъ. Я оставляю на время въ сторонѣ факты, касающіеся содоміи, педерастіи и проституціи, да они и изучены достаточно въ трудахъ Parent-Duchâtelet, A. Tardieu и другихъ. Я стану говорить только о сафизмѣ, о причинахъ способствующихъ его развитію, объ условіяхъ при которыхъ онъ практикуется. Этотъ вопросъ мало извѣстенъ, не смотря на свой величайшій интересъ для врача и моралиста. Причины развитія и распространенія сафизма весьма разнообразны. Онъ кроется то въ публичныхъ домахъ, гдѣ проституція регламентирована; то въ разныхъ притонахъ, въ частныхъ квартирахъ, содержимыхъ съ цѣлю тайнаго разврата; въ разныхъ магазинахъ косметиковъ, перчатокъ и тому под., число которыхъ увеличивается съ каждымъ днемъ; въ гостиницахъ, гдѣ оба пола допускаются только на короткое время. Всѣ эти апартаменты, лавки, всѣ эти гостиницы, хорошо извѣстны въ Парижѣ, — населены и часто посѣщаются женщинами, предающимися сафизму и на женщинахъ и на мужчинахъ.

Иногда же этиологическимъ моментомъ сафизма служатъ такъ называемыя „супружества женщинъ“ (*ménages de femmes*), которые весьма часты, и причинъ которыхъ я не берусь здѣсь доискиваться.

Таковы, Мм. Гг., главныя обстоятельства, которыя я успѣлъ обнаружить, и которыя способствуютъ распространенію сафизма; обстоятельства, дающія мнѣ право сказать, что нынѣ существуетъ *проституція сафизма*, подобно проституціи педерастіи. столь превосходно описанной А. Tardieu.

Нѣсколькихъ словъ будетъ достаточно. чтобы доказать вамъ, Мм. Гг., реальность этой новой проституціи.

Я буду основываться частію на наблюденіяхъ больныхъ изъ моего отдѣленія. (собранныхъ моими учениками, особенно докторомъ Duchastelet), частію же на письмахъ самихъ лицъ, предающихся разнымъ порочнымъ привычкамъ. Съ помощію этихъ соединенныхъ документовъ я могъ изучать нравы трибадистокъ, знакомится съ вліяніемъ, оказываемымъ сафизмомъ на ихъ характеръ и наблюдать форму, принимаемую ихъ чувствами, согласно условіямъ мѣстности и частотѣ акта.

Мы упомянули уже, что сафизмъ практикуется въ публичныхъ домахъ; въ помѣщеніяхъ, находящихся подъ полицейскимъ наблюденіемъ; въ лавкахъ, извѣстныхъ, но ускользающихъ отъ всякаго надзора и, наконецъ, въ частныхъ квартирахъ, въ союзахъ.

Судя по отношеніямъ, установившимся, между такими женщинами, ихъ можно раздѣлить на трибадистокъ, имѣющихъ постоянныя и перемежающіеся сношенія. Изложеніе нѣкоторыхъ фактовъ лучше упрочить эту классификацію, чѣмъ всякія общія разсужденія.

Начнемъ Мм. Гг., съ роли, которую играютъ въ сафизмѣ публичные дома, подверженные наблюденію полиціи. Вотъ письмо отъ женщины изъ Saint-Lazare къ одной изъ ея подругъ; оно будетъ для насъ весьма поучительно, оно покажетъ намъ, какую власть можетъ имѣть одна трибадистка надъ другою. Возбужденная ревностію, по поводу 3-ей женщины, заключенная приглашаетъ свою подругу вписаться добровольно въ полицейскіе списки и поступить въ тюрьму, чтобы не разлучаться и жить вмѣстѣ. Такимъ образомъ, продолжаетъ приглашающая, всякій поводъ къ ревности устранится между нами и мы станемъ жить вполне счастливо. Трудно повѣрить, что на это письмо было отвѣчено согласіемъ, выраженнымъ въ самой страстной формѣ. Публичные дома способствуютъ „супружествамъ женщинъ“. Я скажу болѣе: такія отношенія покровительствуются содержателями и содержательницами публичныхъ домовъ, по слѣдующимъ причинамъ. Привожу ихъ собственные слова: „когда женщины въ кого нибудь влюблены (*lorsque les femmes ont un amant de coeur, un béguin*), онѣ въ свободное время уходятъ и тратятъ собранныя въ теченіи недѣли деньги въ домъ терпимости. Напротивъ, трибадистки не пользуются своею свободою, остаются въ домъ и угощаютъ другъ друга лакомствами и ликерами, что приноситъ доходъ хозяину“. Вотъ, какъ вы видите, могущественная причина для покровительства трибади отъ хозяевъ публичныхъ домовъ, вотъ почему хозяева предпочитаютъ въ своихъ заведеніяхъ супружескую пару отдѣльной женщинѣ.

Хозяева особенно тщательно отыскиваютъ эти пары и являются собирать жатву даже въ наши госпитали, гдѣ, увы, завязываются нерѣдко такія отношенія.

И въ частной жизни встрѣчаются иногда такія супружества. Образованію ихъ способствуютъ разныя пивныя и винныя лавочки со своей женской прислугой. Вы часто встрѣтите 2-хъ такихъ

служанокъ, живущихъ вмѣстѣ и ревниво отвергающихъ всякое сношеніе съ мужчиною. И если, принужденныя безденежьемъ, онѣ совершаютъ un mîchet съ мужчиною, то болѣе всего причутся съ этимъ другъ отъ друга. Трибадистки предпочитаютъ лучше заложить свои драгоценности и даже самую необходимую одежду, чѣмъ сдѣлать другъ другу невѣрность.

Я укажу вамъ на признакъ, по которому ихъ не трудно разузнать: онѣ имѣютъ одинаковые туалеты, одинаковые украшенія и называютъ себя сестрами. Такимъ образомъ выраженіе „petites sœurs“, которое вы часто услышите на шницбалахъ, въ биргалляхъ, на бульварахъ, въ публичныхъ садахъ — сдѣлалось синонимомъ трибадистки.

Чаще всего трибадистки защищаются отъ признанія въ своемъ пороки. Но нѣкоторыя изъ нихъ, наоборотъ, любятъ обнаруживать свои наклонности, съ цѣлью привлечь вниманіе другихъ трибадистокъ; онѣ дѣлаютъ, такъ сказать вытѣску изъ своей профессіи, и публично превозносятся своими побѣдами надъ женщинами.

Супружество женщинъ осложняется иногда: появленіе мужчины вноситъ туда третій элементъ. При этомъ трибадистка видится помимо вѣдома любовника, или мужа, — или же требуетъ отъ мужчины — доставить ей возможность постоянныхъ свиданій, или сожителства съ подругою, къ которой она чувствуетъ страстную привязанность.

Случайныя, перемежающіеся трибадистки составляютъ другой типъ.

Въ ихъ письмахъ вы замѣтите менѣе развитія и болѣе пошлости въ чувствахъ, чѣмъ у трибадистокъ постоянныхъ. Замѣчательно, что женщины, находящіяся въ „женскомъ супружествѣ“, т. е. сохраняющія нѣкоторую вѣрность другъ для друга, оказываются болѣею частію получившими лучшее образованіе и имѣющими болѣе деликатныя чувства.

Переменяющаяся трибадиетка болѣе груба. У нея нѣтъ чувствительности, соединяющей предыдущихъ и заставляющей ихъ любить другъ друга. Почувствовавъ необходимость насытить свои страстные пожеланія, она отиравается, смотря по средствамъ, къ одной изъ новѣйшихъ Лесбіанокъ. ремесломъ которыхъ служить сафизмъ. Она отирается, или въ публичные дома, или въ гостиницы, или въ магазины, составившіе себѣ репутацію по этому предмету, и въ послѣднее время, очень распространенные въ Парижѣ. Она не завязываетъ никакихъ отношеній съ женщинами, сафистками по профессіи, она смотритъ на нихъ, какъ на висшихъ, какъ на пошлицъ. Такую переменяющуюся трибадиетку можно сравнивать съ мундиною. Какъ и послѣдній, она отыскиваетъ дома, гдѣ можетъ насытить свою страсть къ сафизму; какъ онъ, она бережется быть открытою, почему предпочитаетъ такіе дома и магазины, куда можно входить не возбуждая подозрѣній, и это потому, что временная трибадиетка очень часто имѣетъ мужа, или любовника. Иногда-же дѣло идетъ о такой женщинѣ, которая вообще не можетъ довольствоваться „супружествомъ женщинъ“, и для которой достаточно иногда удовлетворить своей страсти къ трибади.

Нѣкоторыя трибадиетки, положимъ это встрѣчается рѣже, нисколько нескрываютъ своихъ порочныхъ наклонностей. Такъ, я знаю одну женщину, уже не молодую (по меньшей мѣрѣ 50-ти лѣтъ), хозяйку пивнаго погребка, которая въ своемъ заведеніи держитъ только женщинъ, удовлетворяющихъ ее порочнымъ наклонностямъ.

Эта старуха садится на первыя мѣста въ кафе-шаптанахъ и бросаетъ публично на сцену букеты, тѣмъ пѣвицамъ, къ которымъ чувствуетъ пристрастіе.

Само дѣтство не изъято отъ унижающихъ поступковъ, о которыхъ шла рѣчь. Существуютъ дѣвочки 10 и 15 лѣтъ, которыя бѣгаютъ подъ предлогомъ продажи цвѣтовъ, но хорошо

извѣстны какъ активныя сафистки (*par leurs manoeuvres saphiques*). Эти несчастныя дѣвочки, часто очень красивыя, хотя и съ синевой подъ глазами, имѣютъ преждевременную самоувѣренность и развращенную рѣчь, крайне неподходящую къ ихъ нѣжному возрасту. Не трудно замѣтить этихъ слишкомъ раннихъ и несчастныхъ агентовъ проституціи сафизма, входящихъ поздно вечеромъ въ кафе, на публичныя балы, или гуляющими по бульварамъ. Онѣ предлагаютъ обыкновенно маленькіе букетики и держатся по 3 и по 4, а за ними немного поодаль вы замѣтите болѣе взрослыхъ личностей, наблюдающихъ за полиціей въ то время, когда дѣвочки дѣлаютъ свои предложенія и женщинамъ и мужчинамъ.

Внѣ упомянутыхъ уже сафистическихъ практикъ, есть другія, замѣчаемыя преимущественно у женщинъ живущихъ проституціей и требующихъ особыхъ возбужденій для насыщенія своей притупленной страстности. Я говорю о сафизмѣ посредствомъ животныхъ. Несмотря на мое живѣйшее желаніе остаться въ предѣлахъ науки, я немогу скрыть нѣкоторыхъ методовъ сафизма: я обязанъ вамъ сказать, что эти женщины не брезгаютъ прибѣгать къ животнымъ; указать вамъ на значеніе тѣхъ прелестныхъ собачекъ, которыхъ онѣ прогуливаютъ и за которыми такъ заботливо ухаживаютъ. Терпѣливая выучка выдрессировала этихъ животныхъ въ искусствѣ замѣнять собою тѣ ощущенія отъ обоехъ половъ, которыя одинаково надобны. Чтобы побѣдить отвращеніе этихъ непослушныхъ иногда, инструментовъ для запретныхъ удовольствій, женщины употребляютъ нѣкоторыя, весьма примитивныя приемы. состояція не въ *золоченіи* но въ *посахариваніи* ниллюи.

Прежде чѣмъ покончить съ изученіемъ этиологическихъ условій и всѣхъ обстоятельствъ, способствующихъ проституціи сафизма, я долженъ, Мм. Гг., сказать нѣсколько словъ о вліяніи мужчины на развитіе и постоянное прогрессированіе этихъ развратныхъ актовъ. Надобно сознаться, что мужчины играютъ

нымъ въ 1874 году однимъ изъ нашихъ драматическихъ авторовъ, членомъ французской академіи. Я заимствую изъ ихъ предисловія къ книгѣ J. Lecour 'а о проституціи въ Парижѣ и Лондонѣ. (*) „Lesbos fait concurrence à Cythère... vous avez des renseignements sur le développement de cette église nouvelle. C'est encore dans les catacombes; dans vingt ans, ce sera sur la place publique“. И вотъ, Мм. Гр., не понадобилось двадцати лѣтъ.

Въ нѣсколько лѣтъ сафизмъ принялъ значительное развитіе. его приверженцы — считаются легіонами. Излагая вамъ предыдущіе факты, говоря объ организаціи новой проституціи сафизма, я имѣлъ чисто научную цѣль. Видя такъ часто измѣненія половой щели (**) и задняго прохода отъ онанизма, сафизма и содоміи, я стремился отыскать причину этой частоты, и такимъ образомъ оправдать предметъ нашего изученія, предметъ имѣющій тѣмъ болѣе значенія, что повторныя развратныя дѣйствія оставляютъ мѣстныя поврежденія на половыхъ органахъ и заднемъ проходѣ, а также производятъ общія нервныя и пищеварительныя болѣзни, съ которыми каждый врачъ долженъ считаться. Философамъ и моралистамъ я предоставляю дѣлать общіе выводы. Практика этихъ развратныхъ, противуестественныхъ актовъ, связана въ концѣ концовъ съ проституціей; она возбуждаетъ социальныя задачи, которыя я постараюсь разрѣшить въ своемъ трудѣ о проституціи. Трудъ этотъ, предпринятый годъ тому назадъ, имѣетъ спеціальной цѣлью отвѣтить на нѣкоторые идеи, находящіяся нынѣ въ большомъ ходу и принадлежація, по моему мнѣнію, къ величайшимъ заблужденіямъ, крайне опаснымъ для общества и для Франціи.

(*) La prostitution à Paris, à Londres. J. Lecour. Paris 1877.

(**) Для избѣжанія частаго повторенія иностранныхъ словъ, я вмѣсто слова „Vulva“ употребляю иногда выраженіе „половая щель“, хотя это не вполне точно передаетъ значеніе органа. Прим. переводчика.

Посмотримъ теперь, Мм. Гг., каковы бываютъ измѣненія половой щели и задняго прохода отъ опанизма, сафизма, содоміи? Станемъ изучать ихъ клиническій характеръ, мѣстныя измѣненія и общія разстройства, вытекающія изъ нихъ съ цѣлью, чтобы и врачъ практикъ и судебный врачъ могли почерпнуть ясныя и точныя указанія о послѣдствіяхъ этихъ пороковъ и подать помощь, если это возможно. Наука наша не стара. Въ самомъ дѣлѣ, если философы и моралисты опозорили акты, производящіе эти измѣненія; то врачи не доискивались ихъ патогностическихъ признаковъ. Нужно было дождаться XVII вѣка, чтобы услышать впервые отъ Павла Закхія объ измѣненіи задняго прохода отъ содоміи. Только въ нашу эпоху признаки эти стали тщательно изучаться Taylor'омъ, Casper'омъ и особенно профессоромъ А. Tardieu.

Авторы эти изучили спеціально измѣненія, производимыя содоміей, мастурбацией и растленіемъ. Въ 1880 году я обнаружилъ впервые изслѣдованія о признакахъ, оставляемыхъ на половой щели раздраженіемъ похотника языкомъ, а также сосаніемъ клитора; акты эти означались издревле именемъ трибадіи. Я предложилъ для нихъ названіе сафизма (Sapho). И такъ вы видите, что это наука не старая; не удивительно поэтому, что съ ней мало знакомы врачи. Съ цѣлью распространить познанія по этому предмету и вновь указать на его громадную важность, я рѣшился описать вамъ эти признаки, знакомство съ которыми столь необходимо для каждаго врача.

Но, прежде чѣмъ заняться клиническимъ описаніемъ означенныхъ измѣненій, я позволю себѣ, Мм. Гг., напомнить вамъ въ нѣсколькихъ словахъ нормальное строеніе половой щели, чтобы вамъ легче было оцѣнить всякое уклоненіе ея отъ нормы.

Vulva для анатомовъ составляетъ совокупность наружныхъ половыхъ органовъ у женщины.

Описаніе ея неограничивается половымъ отверстіемъ; оно изучаетъ большія и малыя губы, похотникъ, мочевое отверстіе, предверіе рукава, Бартолиновы желѣзы и дѣвственную плесу.

У маленькой дѣвочки направленіе вульвы своеобразно: оно вертикально и входъ во влагалище закрытъ большими и малыи губами. Вульва смотритъ прямо впередъ; она полуоткрыта въ своей верхней части. Раздвигая немного губы, замѣчаютъ непосредственно похотникъ и отверстіе мочеваго канала. Нижняя часть вульвы закрыта. У зрѣлой дѣвушки, и особенно у женщины, подвергавшейся попыткамъ къ совокущенію, расположеніе органа совершенно иное. Вульва направляется тогда сверху внизъ и спереди назадъ. Расхожденіе губъ мало выражено въ верхней части; оно болѣе замѣтно внизу, такъ что у взрослыхъ женщинъ клиторъ и мочевое отверстіе покрыты большими губами. Такое устройство органа весьма важно помнить при изученіи разныхъ его измѣненій (*déformations*).

У зрѣлой женщины вульва покрыта волосами, видъ, цвѣтъ и расположеніе которыхъ крайне разнообразны. Я не настаиваю особенно на слѣдующей подробности, не имѣющей для насъ существенной важности, но прошу васъ помнить: чѣмъ богаче волосами половые органы, тѣмъ они развитѣе, такъ что обиліе волосъ находится въ какомъ-то отношеніи съ полнымъ развитіемъ половыхъ органовъ.

Дѣйствительно, при разныхъ случаяхъ, и особенно наблюдал одну больную въ моемъ отдѣленіи, я имѣлъ возможность убѣдиться, что волосъ нѣтъ, если матка и яичники рудиментарны, или отсутствуютъ вполне.

Еще разъ, Ми. Гг., я не особенно наираю на это наблюдение.

Съ каждой стороны полового отверстія имѣются большія губы, состоящія изъ 2-хъ удлинненныхъ кожистыхъ складокъ. Сверху онѣ соединяются непосредственно подъ серединою лобка и образуютъ верхнюю или переднюю снѣйку; внизу онѣ образуютъ нижнюю или заднюю снѣйку, извѣстную подъ именемъ уздечки. Уздечка—это выдающаяся складка, натянутая у молодой невинной дѣвушки; ослабѣвшая у женщины, часто совокупляющейся, и иногда разрывающаяся послѣ 1-хъ родовъ. Наружная сторона большихъ губъ покрыта волосами, внутренняя гладка и при томъ красноватаго или розоваго цвѣта.

Между уздечкою и дѣвственной плевою, или ея остатками (*carunculae myrtiformes*), находится небольшое углубленіе, называемое *ладьеобразною ямкой*. Она подвержена частымъ измѣненіямъ, знаніе которыхъ весьма важно при изученіи вообще разныхъ уклоненій вульвы отъ нормы, и въ частности—признаковъ растленія.

На уровнѣ ладьеобразной ямки находится нѣсколько желѣзистыхъ мѣшечко,ъ, играющихъ извѣстную роль при бѣлихъ.— Съ поступленіемъ моего въ госпиталь Lorcine, т. е. въ теченіи 6-ти лѣтъ, я настаиваю на этомъ важномъ фактѣ при всѣхъ своихъ клиническихъ лекціяхъ, на необходимости знать, что эти желѣзки, дивертикулы Бартолиновыхъ желѣзъ, часто поражаются острымъ или хроническимъ бленнорройнымъ воспаленіемъ, что онѣ служатъ перѣдко причиною зараженій, непонятныхъ для всякаго врача, незнакомаго съ этимъ любимымъ мѣстопробываніемъ бленнорреи у женщины. Эти воспаленные мешечки превращаются иногда въ небольшіе абсцессы, вскрывающіеся обыкновенно возлѣ уздечки. Въ нѣкоторыхъ же случаяхъ—гной затекаетъ кзади, абсцессъ вскрывается на уровнѣ задняго прохода или прямой кишки; послѣдствіемъ бываютъ *fistulae ano-vulvares* или *recto-vulvares*, свищи, всегда полные, потому что абсцессъ вскрывается въ тоже

время и на уздечку
отличаются, какъ
свищей, описывае
только суть, стро
открываются въ с
ныхъ сосочковъ.

Малыя губы
повидному, изъ
овъ пожиатаго св
шми губами; снѣ
плоть и уздечку
покрыты большими
Въ такомъ случа
Нимфы могутъ
швейныхъ маши
Гипертрофія ихт
свихъ народовъ

Похотникт
вѣтствующій пе
думя вѣтвями
лобковыхъ кост
похотника. Раз
обыкновенно р
чаяхъ она ещ
акушерской к
клиторъ равн
у этой молод
была красна
мальнаго орг
порочныхъ ну

время и на уздочкѣ, впереди мясныхъ сосочковъ. Свищи эти отличаются, какъ вы видите, отъ заднепроходно-влагалищныхъ свищей, описываемыхъ обыкновенно въ хирургіяхъ; послѣдніе только суть, строго говоря, *fistulae recto-vaginales*, потому что открываются въ самомъ влагалищѣ, на сантиметръ и выше мясныхъ сосочковъ.

Малыя губы, или нимфы, суть двѣ складки, состоящія, по видимому, изъ слизистой оболочки вульвы, на самомъ же дѣлѣ онѣ кожистаго свойства. Позади и внизу онѣ сливаются съ большими губами; спереди и кверху, раздвигаясь, образуютъ крайнюю плоть и уздечку похотника. Малыя губы бываютъ обыкновенно покрыты большими, но нерѣдко выдаются изъ за послѣднихъ. Въ такомъ случаѣ онѣ пріобрѣтаютъ видъ наружныхъ покрововъ. Нимфы могутъ гипертрофироваться отъ ходьбы, отъ ножныхъ швейныхъ машинъ, отъ верховой ѣзды, отъ совокупленій и пр. Гипертрофія ихъ постоянна и нормальна у нѣкоторыхъ африканскихъ народовъ: кто не слыхалъ о фартукахъ Готтентотокъ.

Похотникъ есть органъ, способный къ напряженію и соотвѣтствующій пещеристымъ тѣламъ у мужчинъ. Онъ составляется двумя вѣтвями, прикрѣпляющимися къ нисходящимъ вѣтвямъ лобковыхъ костей и образующими при своемъ соединеніи головку похотника. Размѣры похотника бываютъ разнообразны. Длина его обыкновенно равняется тремъ сантиметрамъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ она еще значительнѣе: такъ Bousquet, главный врачъ акушерской клиники въ Марсели, приводитъ наблюденіе, что клиторъ равнялся 5 сантиметрамъ и направлялся прямо впередъ. У этой молодой дѣвушки, имѣвшей 16 лѣтъ, головка похотника была красная и объемистая вслѣдствіе постоянного тренія непорочнаго органа объ одежду, а не отъ какихъ-бы то ни было порочныхъ привычекъ. Мы увидимъ впослѣдствіи, что нужна активная медицинская помощь лицамъ, имѣющимъ такой похотникъ.

Клиторъ покрытъ кожиетою складкою, соответствующею кожѣ члена у мужчинъ. Складка эта приростаетъ къ похотнику, но оканчивается образованіемъ въ родѣ мужской крайней плоти, не приростающимъ къ головкѣ, такъ что головка похотника можетъ быть легко открыта. Въ одномъ случаѣ, повидимому единственномъ (*unique*), мнѣ удалось наблюдать полное приращеніе крайней плоти къ головкѣ клитора. Было-ли это врожденное явленіе, или зависѣло просто отъ воспаленія при внѣ-утробной жизни? Я отвергаю послѣднее предположеніе потому, что ни изъ анамнеза больной, ни при осмотрѣ вульвы—я не могъ найти никакихъ слѣдовъ воспаленія. Головка была правда нѣсколько больше нормальной, но это зависѣло отъ мастурбаци, въ которой пациентка созналась.

У мужчины, при нѣкоторыхъ случаяхъ врожденной незалучи, но трудно встрѣтить перемычки и даже полное сращеніе между крайней плотью и головкою члена. За исключеніемъ этихъ случаевъ, при которыхъ продолжительное воспаленіе, постоянное раздраженіе,—играли главную роль, мнѣ неизвѣстны другія сращения. Я справлялся по этому поводу у моего превосходнаго товарища и друга, доктора de Saint-Germain, хирурга въ дѣтскомъ госпиталѣ; но и онъ не могъ мнѣ дать новыхъ указаній.

Между клиторомъ и отверстіемъ рукава имѣется небольшое треугольное пространство, ограниченное съ боковъ малыми дѣтородными губами и называемое преддверіемъ. Въ этой мѣстности вокругъ отверстія мочевого канала, имѣется множество желѣзистыхъ мешечковъ, (*) играющихъ значительную роль при трипперѣ. При всякомъ представляющемся случаѣ, я обращаю особенное вниманіе слушателей на расположеніе триппера гнѣздиться въ такихъ мѣшечкахъ.

(*) На этомъ пространствѣ, по изслѣдованіямъ Мартина и Леже нѣтъ никакого отдѣльнаго аппарата. Желѣзы, описанныя Роберомъ и Гюгье суть только назухи слизистой оболочки. (Курсъ акушерства Лазаревича, стр. 19).

Прим. переводчика.

Между этимъ
и лежащими по
видѣ и на нихъ
Я говорю о тѣхъ
боковыхъ частяхъ
трипперъ, за кото
Гной пробирается
я-же проложитъ
теhralis). Мнѣ
нѣ въ залѣ
найдете трипперъ
нагноенія лѣвой
но фистула не
стно съ описан

Мочевое
вагалища. У
усильно кате
частей. Паль
лица (*tuber*
легко провес
смотреть въ
Напротивъ,
женіи поло
дасть возм

Подъ
кзди отъ
имѣетъ ов
тѣлами, и
расположе
мнѣнію

Между этими образованіями, окружающими мочевоe отверстие, или лежащими по близости его, есть два. имѣющихъ особенный видъ и на нихъ то я хочу спеціально обратить ваше вниманіе. Я говорю о тѣхъ, что помѣщены на сантиметръ кнаружи отъ боковыхъ частей мочевого отверстия. Въ нихъ нерѣдко пребываетъ трипперъ, за которымъ слѣдуетъ воспаленіе и возможенъ нарывъ. Гной пробираясь кнаружи, можетъ выходить по близости уретры, или-же проложить путь въ мочевоy каналъ (*fistula vestibulo-urethralis*). Мы имѣемъ прекрасный примѣръ такого поврежденія въ залѣ Cullerier, у больной подъ № 15-мъ. У нея вы найдете трипперъ и вышеозначенную фистулу. возникшую отъ нагноенія лѣваго мѣшечка. Въ правомъ мѣшечкѣ имѣется гной, но фистула не образовалась. Свищи эти имѣютъ большое сходство съ описанными уже нами и лежащими возлѣ уздечки.

Мочевоe отверстие расположено выше передняго бугорка влагалища. Вы должны помнить это положеніе, если желаете усиленно катетеризировать женщину, не обнажалъ ея дѣтородныхъ частей. Пальцемъ отыскиваютъ окончаніе передней стѣнки влагалища (*tubercule antérieur du vagin*); тогда, держась выше, легко провести катеръ въ уретру. У ребенка мочевоe отверстие смотритъ впередъ, поэтому и струя мочи направляется кпереди. Напротивъ, у взрослой женщины, вслѣдствіе измѣненія въ положеніи половой щели,—мочевоe отверстие смотритъ внизъ. что даетъ возможность мочиться стоя.

Подъ мочевымъ отверстиемъ, сверхъ уздечки, кнутри и кзади отъ малыхъ губъ находится *входъ во влагалище*. Онъ имѣетъ овальную форму и окруженъ двумя способными напрягаться тѣлами, именуемыми *луковницами* влагалища. Кнаружи отъ нихъ расположенъ *musculus constrictor cunnii*, органъ, который, по мнѣнію профессора Richet, гораздо болѣе дѣятельной плесы мѣшаетъ первому совокупленію.

Къ этимъ анатомическимъ замѣткамъ о наружныхъ женскихъ дѣтородныхъ органахъ я прибавлю только нѣсколько словъ о *дѣвственной плевѣ*. Перепонка эта разграничиваетъ вульву со влагалищемъ; она состоитъ изъ складки слизистой оболочки влагалища и составляетъ собою переднюю часть его.

Формы дѣвственной плевы весьма разнообразны онѣ хорошо описаны у А. Tardieu (*) и я не останавлиюсь на нихъ. Скажу вамъ только, что при одной изъ этихъ формъ, а именно при кольцеобразной плевѣ, отверстіе влагалища у молодой дѣвушки, и даже у ребенка, свободно пропускаетъ мизинецъ, такъ что возможно акушерское разслѣдованіе, исобходимое напр. при метритѣ. Вы знаете уже изъ моихъ лекцій о маточныхъ заболѣваніяхъ, что конституціонный метритъ весьма возможенъ у молодой дѣвушки и у ребенка. Кольцевая форма дѣвственной плевы допускаетъ иногда даже введеніе маточнаго зеркала. Наконецъ, совокупленіе можетъ совершиться, за нимъ послѣдовать беременность и все это безъ разрыва дѣвственной плевы. Фактъ этотъ весьма важенъ для судебной медицины, я возвращусь къ нему при разсматриваніи растленія.

Не распространяюсь о Бартолиновыхъ желѣзахъ, намѣреваясь говорить о нихъ подробно въ лекціяхъ о трипперѣ у женщинъ.

Этотъ топографическій обзоръ наружныхъ половыхъ органовъ достаточенъ, чтобы вы могли оцѣнить тѣ измѣненія, которымъ подвергаются вышеозначенныя части подъ вліяніемъ физическихъ причинъ, зависящихъ частію отъ фізіологическихъ отъправленій, частію отъ профессіи женщины, частію же отъ порочныхъ или сластолюбивыхъ привычекъ.

(*) Интересующихся подробностями о дѣвственной плевѣ, отсылаю къ превосходнымъ изслѣдованіямъ Е. В. Пеликана (изслѣдованіе скончатель 1875), В. Мержеевского (Архивъ Суд. Медич., Іюнь и Сентябрь 1871) и И. Лазаревича (курсъ акушерства, страница 23. 1877 г.). *Прим. переводчика.*

Что касается заднего прохода, вы знакомы уже съ его строеніемъ и я не стану вновь его описывать. При разсмотрѣніи измѣненій anus'а отъ содоміи, я обращаю ваше вниманіе на нѣкоторые важные признаки, на уклоненіе органа отъ нормы.

Теперь перейдемъ къ изученію измѣненій вульвы и начнемъ съ описанія признаковъ, остающихся послѣ мастурбаціи, т. е., онанизма, производимаго рукою.

II.

Измѣненія половой щели отъ мастурбаціи (рукоблудія).

Мастурбація встрѣчается всего чаще; случаи ея попадаются намъ ежедневно и я могу сказать безъ преувеличенія, что, по малой мѣрѣ, половина больныхъ моего отдѣленія предается или предавалась этому занятію.

Если мастурбація зависитъ нерѣдко отъ развращеннаго воображенія, отъ хроническихъ мозговыхъ страданій, отъ дурныхъ, примѣровъ и порочныхъ привычекъ, пріобрѣтенныхъ съ дѣтства, а также отъ слишкомъ возбуждаемыхъ половыхъ страстей,—то необходимо высказать, что весьма часто у молодой и у взрослой дѣвушки рукоблудіе бываетъ послѣдствіемъ страданій половой щели, влагалища, или матки, сопровождающихся зудомъ половыхъ частей, причину котораго обязательно для врача разыскать. Пока считаю достаточнымъ сказать, что такъ называемый нервный зудъ зависитъ болѣею частію отъ простаго травматическаго или конституціональнаго воспаленія вульвы, влагалища, или матки.

У дѣтей всегда слѣдуетъ помнить о маленькихъ глистахъ, называемыхъ охуисес, дѣтскія острицы. Онѣ живутъ въ нижней части прямой кишки, но ночью могутъ заползати in vulvam и даже in vaginam и обусловить собою нестерпимый зудъ, который

приучаетъ ребенка къ рукоблудію. Острицы встрѣчаются и у молодыхъ дѣвушекъ и даже у взрослыхъ женщинъ, у которыхъ я наблюдалъ много разъ присутствіе охуиis, вызывавшее ватниты. Стоитъ удалить червячковъ и ватнитъ быстро прекратится. Въ такихъ случаяхъ примѣнялись мною влагалищныя орошенія щелочною водою, напр., водою Vichy, Vals и т. под.

Мастурбація, какъ вы видите, можетъ развиваться и безъ мозговыхъ страданій и безъ порочныхъ привычекъ; это нужно всегда помнить, желая имѣть ясныя и точныя указанія для борьбы съ этой привычкой.

Въ чемъ же состоятъ измѣненія вульвы отъ мастурбаціи? И какими способами производится послѣдняя?

Я принужденъ нѣсколько распространиться о способахъ мастурбаціи, потому что каждый изъ нихъ производитъ своеобразныя измѣненія похотника и вульвы, имѣющія такой точный клиническій характеръ, что по нимъ можно бываетъ узнать, какъ именно производилось раздраженіе. Извините за подробности, которыми заняться необходимо.

Клиторъ обыкновенно раздражается треніемъ рукою производимымъ хозяйкою органа, или-же постороннею особою. Треніе производится или пальцемъ (рукоблудіе, мастурбація), или инымъ предметомъ (опанизмъ), или языкомъ (сафизмъ). При послѣднемъ треніе сопровождается сосаніемъ.

Перечисленіе предметовъ, которыми раздражаютъ клиторъ, было-бы безцѣльно и отняло-бы слишкомъ много времени. Упомяну только, что молодыя дѣвушки перѣдко прибѣгаютъ къ шпилькѣ, къ игольному крючку и т. под. Такого рода треніе не лишено опасностей. Послѣдствіемъ бываетъ много непріятныхъ случаевъ, напр., прониканіе инороднаго тѣла въ мочевою каналъ, или мочевою пузырь, гдѣ послѣднее, какъ это хорошо извѣстно хирургамъ, можетъ стать ядромъ мочевого камня.

При другихъ
нѣмъ похотника
женщины. Съ
движенія тазово
раздражается д
бедръ. Такая р
у женщинъ, з
модистокъ, по
также у женщи
торыхъ охотни
производить с

Каковы-
рная различ
ихъ отличите
Mussy утвер
увеличеніе, и
что подчас
нормы. У о
длихъ мизин
не въ поро
наго возраст
блудію. Но
ческое увели
Bousquet;
Duchâtelet.
клиторъ им
сантиметровъ

(*) Счи
турбація (ру
сафизма. Мн
мною только
названъ опан

При другихъ обстоятельствахъ, онанизмъ практикуется трениемъ похотника бедрами въ сидячемъ, или стоячемъ положеніи женщины. Съ этой цѣлью женщина производитъ своеобразныя движенія тазомъ, при чемъ нога положена на ногу, а похотникъ раздражается движеніями верхнихъ и внутреннихъ поверхностей бедръ. Такая разновидность онанизма встрѣчается преимущественно у женщинъ, занятыхъ сидячими работами. Вы замѣтите его у модистокъ, портнихъ, бѣловеекъ и гладильщицъ бѣлья. а также у женщинъ, работающихъ на швейной машинѣ и у нѣкоторыхъ охотницъ до верховой ѣзды. Такой методъ онанизма (*) производитъ спеціальныя измѣненія половыхъ органовъ.

Каковы-же клиническіе признаки онанизма вообще? Разсматривая различные методы раздраженія, я постараюсь указать на ихъ отличительные признаки.—А. Tardieu и Noël Guéneau de Mussy утверждаютъ, что важнымъ признакомъ онанизма служитъ увеличеніе, преимущественно удлинненіе всего похотника, такъ что подчасъ клиторъ достигаетъ двойной длины противъ нормы. У одной изъ моихъ пациентокъ клиторъ равнялся по длинѣ мизинцу, и причина этаго заключалась въ онанизмѣ, а не въ порокахъ развитія: больная призналась, что съ самого нѣжнаго возраста она по нѣскольку разъ въ день предавалась рукоблудію. Но необходимо знать, что бываетъ иногда и физиологическое увеличеніе клитора. Я упоминалъ выше о случаѣ доктора Bousquet; вы найдете много другихъ въ сочиненіи Parent-Duchâtelet. Этотъ авторъ приводитъ множество наблюденій, что клиторъ имѣлъ объемъ указательнаго пальца и длину 7 до 8 сантиметровъ.

(*) Считаю необходимымъ оговориться, что авторъ употребляетъ слово мастурбация (рукоблудіе), для всѣхъ раздраженій половыхъ органовъ, за исключеніемъ сафизма. Мнѣ кажется это неправильнымъ, почему выраженіе мастурбация примѣнено мною только къ раздраженію рукою; другіе же виды раздраженія половыхъ частей—названы онанизмомъ. Прим. переводчика.

Вмѣстѣ съ удлинениемъ и утолщеніемъ клитора, головка его становится отъ повторныхъ раздраженій длиннѣе, краснѣе, пухлѣе и болѣе выдается изъ за крайней плоти. Крайняя плоть дѣлается мягче, длиннѣе, глаже или складчатѣе; она легко сдвигается съ головки похотника. Кромѣ того, крайняя плоть становится иногда толще и плотнѣе, какъ-бы гипертрофируется.

Такой видъ клитора замѣчается преимущественно послѣ треній пальцами, членомъ или инородными тѣлами.

Кромѣ измѣненій клитора, находятъ въ половой щели и другіе признаки, особенно если онанизмъ начался съ юнаго возраста. Такъ, малыя губы пріобрѣтаютъ своеобразный видъ: онѣ удлиннены, плоски и висятъ изъ за большихъ губъ; ихъ треугольная форма бываетъ рѣзче выражена, особенно кверху. Такія губы сравниваютъ съ листьями шалфея, съ крыльями летучей мыши. Онѣ становятся свѣтчатыми и морщинистыми. По мѣрѣ отвисанія, розовый цвѣтъ губъ исчезаетъ, появляется бурое, сѣрое, или асидное окрашиваніе. На нихъ вы усмотрите темныя пятна, зависящія отъ усиленной пигментаціи, развивающейся преимущественно у свободного края нимфъ, иногда же занимающей цѣлую ихъ поверхность (чаще наружную). Кромѣ того, на внутренней поверхности, или на одной только части внутренней поверхности губъ, у свободного края, удается иногда отыскать рядъ маленькихъ, желтыхъ, или бѣлыхъ точекъ, сходныхъ по словамъ N. Guéneau de Mussy, съ яичками насѣкомыхъ. Эти бѣлыя точки состоятъ изъ гипертрофированныхъ желѣзъ. Нахожденіе такого признака весьма важно: точки доказываютъ, что въ половой щели существуетъ съ дѣтства воспалительное состояніе, или же зудящая сыпь (prurigo), бывающія такъ часто причиною онанизма.

Вышеозначенныя измѣненія наблюдаются на обѣихъ малыхъ губахъ, но преимущественно на лѣвой, и происходятъ отъ сильнаго растиранія губъ ребенкомъ.

Болѣе рѣдко
и морщинист
онанизма
можетъ тоже ослаб
ежите, Мм. Гг.,
ахъ падетъ къ
который была-бы со

Но это не в
кому растяженію,
чему становится
совокупленіе бывае
особенно останавли
на измѣненіяхъ
цѣлю указать,
можетъ неостави
вычайно важно
чашъ упоминаю
стороны, если
упорныя бѣлыя, т
плагалища. Отт
и плотность, ч
совокупленіи. Т
части плесы с
развитіи вульв

Разные
застанная пол
ніи, могутъ е

Такимъ
хотника и к

Болѣе рѣдко удается замѣтить, что и большія губы стали
плотнѣе и морщинистѣе, что мочевой каналъ открытъ и расширенъ.
Вслѣдствіе онанизма у дѣвочекъ и мальчиковъ сфинктеръ пузыря
можетъ тоже ослабѣть и обусловить этимъ недержаніе мочи. Вы
видите, Мм. Гг., что знакомство съ измѣненіями половыхъ орга-
новъ ведетъ къ объясненію такихъ патологическихъ явленій,
которые были-бы совершенно не понятны безъ изученія ихъ причинъ.

Но это не все: дѣвственная плева подвергается значитель-
ному растяженію, и *constrictor cunni* теряетъ свой тонусъ, по-
чему становится легче проникнуть во влагалище, такъ что даже
совокупленіе бываетъ возможнымъ безъ разрыва *hymenis*. А. Tardieu
особенно останавливается на измѣненіяхъ вульвы отъ онанизма,
на измѣненіяхъ дѣвственной плевы отъ этой же причины, съ
цѣлью указать, что расгленіе, при подобныхъ обстоятельствахъ,
можетъ неоставить никакихъ слѣдовъ; знаніе этого факта чрез-
вычайно важно для судебного врача. Авторы въ подобныхъ слу-
чаяхъ упоминаютъ даже о возможности забеременѣть. Съ другой
стороны, если у золотушныхъ дѣтей разовьется вульвитъ и
упорныя бѣли, то легко воспалятся дѣвственная плева и отверстіе
влагалища. Отъ этого гименъ можетъ пріобрѣсти такую толщину
и плотность, что становится непобѣдимымъ препятствіемъ при
совокупленіи. Тогда врачъ бываетъ обязанъ надрѣзать боковыя
части плевы съ цѣлью облегчить введеніе *penis'a* и избѣжать
развитія вульвизма.

Разные способы, употребляемые при раздраженіи клитора,
заставляя половыя части претерпѣвать описанныя выше измѣне-
нія, могутъ еще вести къ разнообразнымъ мѣстнымъ поврежденіямъ.

Такимъ образомъ произошло, напр., воспаленіе головки по-
хотника и крайней плоти, которое мнѣ удалось наблюдать у
одной больной.

Воспаленіе это выражалось краснотою, увеличеніемъ мѣстной температуры и опуханіемъ органа. Обыкновенно такое воспаленіе бываетъ травматическаго происхожденія и зависитъ отъ ссадины, произведенной ногтями; оно долго не заживаетъ. Воспаленіе половой щели и мочевого отверстія бываетъ иногда у маленькихъ дѣвочекъ результатомъ онанизма, а не причиною послѣдняго.

Наконецъ, послѣдствіемъ онанизма, особенно производимаго постороннею особою являются нерѣдко маленькіе бѣлые рубчики, имѣющіе форму полумѣсяца, зависящіе отъ ссадинъ и язвочекъ вслѣдствіе расцарапыванія ногтями, и располагающіеся на похотникѣ, на нимфахъ, на предверіи и на мочевомъ отверстіи.

При поименованіи всѣхъ случайныхъ осложненій мастурбаци (рукоблудія) я не долженъ забывать воспаленія и нагноенія Бартолиновыхъ желѣзъ. Я часто наблюдалъ такіе страданія и описалъ ихъ въ другомъ мѣстѣ. Воспаленіе это—травматическаго характера. Оно происходитъ отъ неистоваго тренія не только похотника, но и всей половой щели.

Таковы, Мм. Гг., признаки онанизма вообще и въ частности мастурбаци (рукоблудія).

Если-же онанированіе производится треніемъ бедръ, то измѣненія пупльвы имѣютъ особый характеръ. Такого рода онанизмъ свойствененъ преимущественно взрослой женщинѣ, но иногда онъ встрѣчается и у дѣтей. Не довѣряйте дѣвочкамъ, которыя любятъ уединеніе и тамъ производятъ вышеописанное движеніе тазомъ: онѣ онанируютъ. И вскорѣ вы дождетесь у нихъ разнообразныхъ растройства питанія и страданій нервныхъ, причина которыхъ осталась бы для васъ не понятною, если-бы вы не были предупреждены о возможности онанированія бедрами, оставляющаго слѣдующіе признаки. Крайняя плоть клитора, обыкновенно весьма

развита при
буклей голов
корцинь, ни
ва-то и не в
клитора выд
скорѣе плос
головка клит
діаметръ бол

Похотн
красный, ил

Такая
когда не ра
рованіе бод

При
малыя губы
И въ этом
ныя рукобл
дѣтскаго в
преимуществ

Въ
онанизму
раздражен

Так
больныхъ

Въ
наблюден
острый,
ждаемый
истощае

развита при рукоблудіи, здѣсь мало развита относительно разбухшей головки похотника: она не удлинена, не имѣетъ ни морщинъ, ни складокъ, не легко снимается съ похотника, но ва-то и не вполне его покрываетъ. И дѣйствительно, головка клитора выдается; оконечность ея какъ-бы распухла и вся головка скорѣе плоска, чѣмъ удлинена. Словомъ, можно сказать, что головка клитора имѣетъ видъ палицы, такъ какъ поперечный ея діаметръ болѣе продольнаго.

Похотникъ постоянно почти напряженъ, цвѣтъ его темнокрасный, или синеватый.

Такая картина получается у тѣхъ женщинъ, которыя ни когда не раздражали себя иными путями и притомъ, если онанированіе бедрами производилось въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ.

При этомъ-же видѣ онанированія вы замѣтите еще, что малыя губы менѣе развиты, менѣе объемисты, менѣе удлинены. И въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго: поврежденія, свойственныя рукоблудію развиваются отъ раздраженій, начинающихся съ дѣтскаго возраста, при чемъ ребенокъ вслѣдствіе зуда третъ преимущественно малыя губы.

Въ случаяхъ, когда рукоблудіе задолго предшествовало онанизму бедрами, вы найдете главные признаки обоихъ способовъ раздраженія.

Такіе случаи представляются вашему вниманію у троихъ больныхъ, помѣщенныхъ въ палатахъ Natalis-Guillot и Cullerier.

Въ прежнихъ лекціяхъ я опубликовалъ уже два подобныя наблюденія. Послѣдствіемъ онанизма бедрами можетъ быть также острый, подострый, или даже хроническій вульвитъ, сопровождаемый болѣе, или менѣе гнойнымъ отдѣленіемъ. Иногда встрѣчается и воспаленіе Бартолиновыхъ желѣзъ.

Что касается третьяго вида раздраженія, т. е. тренія и сосанія похотника языкомъ (сафизма), то свойственные ему признаки и измѣненія половой щели ясны и точны, не менѣе вышеописанныхъ. Они происходятъ отъ одновременнаго тренія клитора и отъ сосанія ртомъ нижняго края крайней плоти и выдающейся головки похотника.

Поэтому измѣненія отъ сафизма состоятъ въ удлинненіи всего похотника, въ морщиноватости и вялости покрововъ клитора и особенно крайней плоти, оставляющей часть головки открытою. Похотникъ объемистъ и напряженъ. Все это зависитъ отъ тренія. Благодаря-же сосанію, болѣе замѣтно выстояніе клитора и весь органъ становится объемистѣе, почему и выдается изъ за большихъ губъ. Особенно объемиста бываетъ крайняя плоть; она сходитъ вполнѣ съ головки похотника, оставляя ее большею частію открытой. Поднятая кверху крайняя плоть образуетъ надъ головкой выступъ въ родѣ каски. Въ то же время ея свободный край толще и плотнѣе нормальнаго. Уздечка клитора плотнѣе и болѣе выражена. Такія измѣненія вида и строенія половыхъ частей замѣчаются иногда и ниже похотника на 2 или на 3 миллиметра на свободныхъ краяхъ малыхъ губъ. Возвращаясь къ похотнику, замѣчу еще, что головка его бываетъ очень развита, сильно выдается и имѣетъ набухшую оконечность. Поперечный діаметръ ея увеличенъ, похотникъ сплюснутый нѣсколько по краямъ, какъ-бы набухъ въ средней своей части, словомъ, мы имѣемъ булавовидный клиторъ, напоминающій собою такой органъ бывающій послѣдствіемъ онанированія бедрами.—Цвѣтъ клитора темно красный, иногда синеватый; постоянная почти напряженность, особенно если сафизмъ практикуется ежедневно, или же по много разъ въ день, что нерѣдко встрѣчается у трибадистокъ живущихъ въ „супружествѣ“, а также у нѣкоторыхъ иныхъ женощикъ. Я могъ-бы привести вамъ много примѣровъ, но ограничусь двумя слѣдующими:

Въ первомъ, матери
множенія по
принуждала
теченіи сутокъ

Другой
лѣтъ до зам
Нѣсколько
преодолѣть
мужа жить
ныхъ случая
страданіе; я

Клини
выраженъ,
послѣдній,

Но,
распознаван

Другі
вляють ни
И если на
органахъ,
или въ
рукоблудіи

Всѣ
ваше вни
ногтями,
жденія,
но

Въ первомъ рѣчѣ идетъ о тридцатилѣтней замужней женщинѣ, матери многихъ дѣтей, которая, опасаясь-ли новаго умноженія потомства, или неудовлетворяясь болѣе совокупленіемъ, принуждала своего мужа, сафировать ее два или три раза въ теченіи сутокъ.

Другой касается молодой женщины, имѣвшей за нѣсколько лѣтъ до замужества подругу, съ которой и предавалась сафизму. Нѣсколько времени послѣ замужества, но въ состояніи будучи преодолѣть своихъ чувствъ къ подругѣ, она заставила своего мужа жить втроемъ. Ясно, Мм. Гг., что въ обоихъ вышеописанныхъ случаяхъ рѣзко выступаетъ и нравственное и психическое страданіе; я не могу дать иного объясненія такимъ поступкамъ.

Клиническій характеръ признаковъ сафизма болѣе или менѣе выраженъ, смотря потому постоянно ли или временно практикуется послѣдній, давно-ли онъ существуетъ, или недавно.

Но, во всякомъ случаѣ, признаки достаточно ясны для распознаванія этаго развратнаго акта.

Другія части вульвы, большія и малыя губы, не представляютъ никакихъ измѣненій, свойственныхъ спеціально сафизму. И если намъ представляется что нибудь не нормальное въ этихъ органахъ, то причины надо доискиваться, или въ прежней жизни, или въ сопутствующихъ сафизму привычкахъ, напримѣръ въ рукоблудіи.

Вспомнимъ, что при разсматриваніи рукоблудія и обращать ваше вниманіе на воспалительныя поврежденія, произведенныя ногтями, при сафизмѣ встрѣчаются тоже воспалительныя поврежденія, раны, язвы и какъ слѣды ихъ—рубцы, но причина поврежденій—зубы.

Я часто наблюдалъ такія поврежденія; между прочимъ у 22 лѣтней больной, находящейся въ палатѣ Natalis-Guillot, на койкѣ № 12. Эта больная, начавшая совокупляться съ 17 лѣтъ, представляетъ высшую степень измѣненій, зависящихъ отъ рукоблудія, продолжающагося съ дѣтскаго возраста (она созналась, что одна изъ подругъ онанировала ее ежедневно пальцемъ).— Но, кромѣ другихъ признаковъ, у нея было изъязвленіе, расположенное вокругъ головки похотника и зависящее отъ укушенія подругою, пришедшею въ страстное неистовство во время совершенія надъ первою акта сафизма. Язва эта потребовала мѣсяца для своего заживленія.

Въ другомъ случаѣ, наблюдавшемся мною въ городѣ, укушеніе было такъ сильно, что клиторъ совершенно почти отдѣлился. Мнѣ стоило большого труда остановить кровотеченіе; заживленіе тянулось чрезвычайно долго.

Таковы, Мм. Гг., измѣненія половыхъ органовъ отъ сафизма. Они достаточно отличаются отъ признаковъ рукоблудія и другихъ раздраженій вульвы.

Перейдемъ теперь къ практическому значенію послѣдствій разныхъ видовъ онанизма.

Послѣдствія эти весьма разнообразны.—

Прежде чѣмъ ихъ разсматривать, я скажу нѣсколько словъ о тѣхъ расстройствахъ нервовъ и общаго питанія, которыя идутъ за онанизмомъ.

Авторы, привлекавшіе вниманіе на такія нервныя расстройства, просмотрѣли одинъ фактъ, а именно, что нервныя страданія столь же часто слѣдуютъ за онанизмомъ, сколько и предшествуютъ ему.

Во многихъ случаяхъ по словамъ Д-ра Moreau, невозможно бы было объяснить извращенія половыхъ инстинктовъ, наблюдаемаго

и мучитъ и у
ности, страданія
днсно множеств
а теперь прощу
случаевъ извращ

Что касает
и сафизмомъ, то
давно началась
Moreau, неумѣр
дѣйствуютъ так
стойніе субъекта
граничатъ съ с

Чтобы въ
трибадистокъ.
одушевляющей
когда онъ быва
чтобы понять,
ступленіемъ, н

Рядомъ
чительнаго по
общія или м
глубоко потря

Такимъ
чувствительно
рованы въ
растезію и п
одышку, на
и блефароспа
рическія, ил

Наруш

у мужчинъ и у женщинъ, если не допустить умственной ненормальности, страданія психическаго. Психіатры приводятъ этому ежедневно множество примѣровъ. И я вамъ укоминать о нѣкоторыхъ. а теперь прошу имѣть все это ввиду при разборѣ застарѣлыхъ случаевъ извращенія полового чувства.

Что касается нервныхъ страданій, причиняемыхъ онанизмомъ и сафизмомъ, то ихъ нельзя отрицать, особенно если акты эти давно начались и часто производятся. По словамъ того-же Д-ра Moreau, неумѣренные возбужденія и чрезмѣрные наслажденія воздѣйствуютъ такимъ угнетающимъ образомъ на нравственное состояніе субъекта, что всѣ удовольствія и наслажденія этихъ лицъ граничатъ съ бѣшенствомъ и звѣрствомъ.

Чтобы въ этомъ убѣдиться, достаточно почитать письма трибадистокъ. Надо дать себѣ отчетъ въ безумной страсти, воодушевляющей ихъ; надо познакомиться съ силою ихъ ревности, когда онѣ бывають обмануты въ своей противуестественной любви;— чтобы понять, что такая женщина не отступитъ ни передъ преступленіемъ, ни передъ самоубійствомъ.

Рядомъ съ психическими уклоненіями, зависящими отъ значительнаго поврежденія нервной системы, встрѣчаются нерѣдко общія или мѣстныя болѣзненныя явленія, указывающія какъ глубоко потрясена эта система онанизмомъ и сафизмомъ.

Такимъ образомъ, Мм. Гг., вы встрѣтите, то измѣненія чувствительности и движенія, то нервныя страданія, сконцентрированныя въ одномъ органѣ. Женщины жалуются то на гипертрофію и анестезію, то на параличи, то на сердцебиеніе, то на одышку, на разстройства пищеваренія, аккомодация, на фотопсію и блефароспазмъ. Одновременно женщина жалуется еще на истерическія, или гистеро-эпилептическія явленія.

Нарушеніе общаго питанія тоже весьма замѣтно. Да это и не удивительно, если вспомнить, что нервы сильно поражены.

Субъектъ бываетъ изнуренъ, слабъ, не способенъ ни къ какому мышечному напряженію; лицо блѣдно. утомлено; глаза ограничены темно-бурыми кругами; пищеварительныя функціи медленны и трудны и т. дал. Кромѣ поименованныхъ страданій, слѣдующихъ за онанизмомъ, встрѣчаются еще заболѣванія, повидимому мѣстныя, но требующія особеннаго вниманія и могущія иногда намекнуть намъ на причину болѣзни.

Таковы, кромѣ воспаленій вульвы, зависящихъ отъ онанизма, еще разные виды метритовъ: конституціональный, золотушный, артритическій, появленіе которыхъ обусловливается тоже онанизмомъ.

Въ лекціяхъ о болѣзняхъ матки я достаточно обращалъ ваше вниманіе на этотъ предметъ; остается добавить, что онанизмъ оказываетъ крайне неблагопріятное вліяніе на ходъ метритовъ, обусловливая частые ихъ возвраты, такъ, что выздоровленіе и запаздываетъ и трудно достигается. Словомъ, онанизмъ служитъ причиною множества заболѣваній: какъ-же съ нимъ бороться? Въ такихъ случаяхъ роль врача двоякая: онъ долженъ быть и терапевтомъ и моралистомъ. Сначала врачъ употребитъ все свое нравственное вліяніе, чтобы добиться прекращенія онанизма; при этомъ онъ опишетъ гибельныя послѣдствія этого порока. Если убѣжденіе не дѣйствуетъ, остается прибѣгнуть къ терапіи и здѣсь представляется много показаній:

1) Медикъ ищетъ прежде мѣстной причины, а именно страданій, производящихъ зудъ и слѣдующій за нимъ онанизмъ. Задача врача — устранить воспаленіе вульвы, влагалища, или матки, заживить сыни на дѣтородныхъ органахъ. Онъ не долженъ забывать объ острицахъ и, въ случаѣ ихъ нахожденія, назначить энергическое леченіе.

2) Если не открывается никакихъ мѣстныхъ страданій, если идетъ дѣло о такомъ психическомъ состояніи, при которомъ акты эти совершаются какъ-бы безсознательно, или онанизмъ зависитъ

отъ ненормал
врачу остается
которыхъ пре
ное и полное

Нѣтъ с
напр., когда
изнуреніе, и
самоубійству
считающійся
каутеромъ и
операций (дл
опасности. П
даже смерть
каутеромъ, —
гдѣ мой тов
очень опасн
во время о
случаяхъ.

3) Тр
ныхъ при
низма, а т
тѣхъ-же пр
средствамъ
къ морским
(Salins, S
щелочно-со
знатымъ (с
всѣ средст

(*) М
этотъ спис
и т. под.).

отъ ненормально-развитаго органа (случай Д-ра Bousquet) то врачу остается только прибѣгнуть къ хирургическимъ средствамъ, которыхъ предложено было не мало. таковы: прижиганіе, частичное и полное удаленіе похотника.

Нѣтъ сомнѣній, что въ присутствіи тяжелыхъ заболѣваній, напр., когда вслѣдствіе онанизма начинается общее изнуреніе, или психозы съ наклонностію къ убійству или къ самоубійству — врачъ имѣетъ полное право уничтожить органъ, считающійся воспріемникомъ страстныхъ ощущеній, оперируя термокаутеромъ или просто bistureemъ. Это одна изъ самыхъ легкихъ операцій (для хирурга); но не думайте, что она свободна отъ опасности. Послѣдствіемъ ея могутъ быть тяжелыя болѣзни и даже смерть: такъ, послѣ попытокъ уничтожить похотникъ термокаутеромъ, — появлялись абсцессы и перитонитъ. Въ одномъ случаѣ, гдѣ мой товарищъ, Д-ръ Guibout, сдѣлалъ прижиганіе, — появился очень опасный перитонитъ. Поэтому будьте особенно внимательны во время операціи и прибѣгайте къ ней только въ крайнихъ случаяхъ.

3) Третье терапевтическое показаніе, касается леченія нервныхъ припадковъ, служащихъ причиною, или слѣдствіемъ онанизма, а также леченія общаго упадка питанія, зависящаго отъ тѣхъ-же причинъ. Съ этой цѣлью врачъ можетъ прибѣгнуть къ средствамъ противусудорожнымъ, тоническимъ, къ водолеченію, къ морскимъ купаньямъ, къ минеральнымъ водамъ, солянымъ, (Salins, Salies), сѣрнымъ (Luchon, Aix-les-Bains), щелочнымъ щелочно-солянымъ (Saint-Nectaire, Chateauneuf) или къ желѣзистымъ (la Bauche, Orezza etc). (*) Словомъ онъ употребитъ все средства, даваемые ему наукой и опытомъ.

(*) М. перечисляетъ только французскіе воды; я считалъ лишнимъ дополнять этотъ списокъ, потому что качествено воды обозначено (щелочныя, щелочно-соляныя и т. под.). Слѣдовательно каждый врачъ легко найдетъ требуемую воду въ ближайшей къ пациенту мѣстности. Прим. переводчика.

Въ изученіи признаковъ на половыхъ органахъ отъ онанизма есть еще одна практическая сторона. Эти измѣненія до такой степени развиты, такъ распространены; акты, производящіе ихъ такъ потрясаютъ организмъ женщины, — что при судебныхъ экспертизахъ, врачъ долженъ съ ними также считаться, какъ и съ другими страданіями. Напр.. при дѣлахъ о растленіи, изнасилованіи и особенно при бракоразводныхъ процессахъ. Въ дѣлахъ о шантажѣ, а именно, при обвиненіи кого нибудь въ попыткѣ растлѣть ребенка, или изнасиловать взрослую, необходимо точно изслѣдовать состояніе половой щели, убѣдиться существуютъ-ли въ ней, или нѣтъ, признаки онанизма, чтобы познакомить судъ съ привычками жалующейся особы и противодѣйствовать шантажу, который собираетъ богатую жатву отъ мнимаго растленія и отъ содоміи.

Я кончилъ. Мм Гг., съ изученіемъ вульварныхъ измѣненій, зависящихъ отъ разныхъ видовъ онанизма; перехожу теперь къ разсматриванію растленія.

II.

Измѣненія наружныхъ женскихъ половыхъ органовъ отъ растленія.

Попытки къ совокупленію, совокупленіе, оставляютъ столь рѣзкіе слѣды въ половыхъ органахъ, что съ давняго уже времени привлекли на себя вниманіе врачей вообще и въ особенности судебныхъ врачей. Въ самомъ дѣлѣ, врачи, приглашаемые судомъ по поводу преступныхъ дѣйствій изнасилованія, или попытокъ къ нему, растленія и т. под., припуждены были доискиваться признаковъ, оставляемыхъ вышеозначенными актами, чтобы имѣть возможность отвѣчать по совѣсти на разнообразные вопросы судьи. Предметомъ этимъ занимались спеціально А. Toulmouch, и въ особенности А. Tardieu, выказавшіи здѣсь вполне свой знаменитый клиническій талантъ. И если-бы я имѣлъ лишь цѣлью говорить о слѣдахъ

преступныхъ
къ изученію
ише вниманію
ленія, — я из
акты, будетъ
ихъ какъ дѣ
злуютъ-ли пр
которыхъ мо
Такія изслѣ
и особенно
какъ и вамъ
и стараюсь
нію и польз
дававшимъ
анія спеціал

Изуче

раснадастс
оставляемы
оно соверш
насилъстве
за постене
оцять так

Пери

Вслѣдстві
поврежден
соотвѣст
Достаточ
лочки вл
вергающі
текахъ
и т. по

преступныхъ дѣйствій. то мнѣ оставалось-бы только отослать васъ къ изученію означенныхъ сочиненій. Но цѣль моя другая: призывая ваше вниманіе на судебно-медицинское значеніе признаковъ растленія, — я изучаю ихъ, главнымъ образомъ въ смыслъ полового акта, будетъ-ли онъ добровольнымъ, или преступнымъ; и разсматриваю ихъ какъ дѣйствіе проституціи. Я желалъ-бы добиться, представляютъ-ли проститутки такія измѣненія половыхъ органовъ, по которымъ можно-бы было опредѣлить съ точностію ихъ ремесло. Такія изслѣдованія интересуютъ спеціально нѣкоторыхъ врачей, и особенно врачей полиціи и благотворительныхъ заведеній. Такъ какъ и вамъ могутъ понадобится такого рода свѣдѣнія, то я и стараюсь обратить на этотъ предметъ ваше спеціальное вниманіе и пользуюсь значительнымъ матеріаломъ нашего госпиталя, дававшимъ мнѣ возможность провѣрять въ теченіи 7 лѣтъ указанія спеціалистовъ, напр. Д-ра Charpy (de Bordeaux) и другихъ.

Изученіе половыхъ измѣненій, зависящихъ отъ растленія, распадается прямо на два отдѣла. Необходимо отличать признаки оставляемые отдѣльнымъ стремительнымъ совокупленіемъ, будетъ-ли оно совершено вполнѣ, или не окончено, добровольно, или же насильственно, — отъ измѣненій половыхъ органовъ, слѣдующихъ за постепенными, постоянными и повторными половыми сношеніями, опять таки — добровольными, или вынужденными.

Первая группа представляетъ менѣе научнаго интереса. Вслѣдствіе стремительнаго совокупленія являются разнообразныя поврежденія, смотря по возрасту и по большей или меньшей соотвѣтственности половыхъ органовъ лицъ, участвующихъ въ актѣ. Достаточно назвать разрывы дѣвственной плевы, слизистой оболочки влагалища, болѣе или менѣе обильныя кровотеченія, подвергающія иногда жизнь опасности. Я напому вамъ еще о подтекахъ въ половой щели, о воспаленіяхъ вульвы, мочевого канала и т. под.

Во второй группѣ измѣненія вульвы гораздо разнообразнѣе. Отъ повторныхъ попытокъ къ совокупленію, половые органы измѣняютъ свой видъ, строеніе, получаютъ различныя поврежденія. Правильная оцѣнка этихъ измѣненій особенно важна для врача, потому что ему могутъ предложить вопросъ, давно-ли начались попытки къ растленію, или недавно; остались-ли или нѣтъ, на половыхъ органахъ, слѣды постоянныхъ и привычныхъ половыхъ сношеній?

Совокупленіе постепенное, не стремительное, но за то повторное оставляетъ тѣмъ болѣе слѣдовъ, чѣмъ моложе субъектъ, подвергающійся ему. Мнѣніе это высказано А. Toulmouche'мъ и А. Tardieu, и оно въ высшей степени вѣрно; но, разумѣется, имѣетъ исключенія. Если часто случается, что совокупленіе съ дѣтьми, или молодыми дѣвушками не оставляетъ вовсе, или оставляетъ едва замѣтные слѣды (*); то бываетъ и на оборотъ, бываетъ что совокупленіе съ женщиною 30 до 40 лѣтъ сопровождается рѣзкими признаками на половыхъ органахъ послѣдней. при условіи, что оно началось не болѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ тому назадъ.

Множество обстоятельствъ вліяетъ на развитіе измѣненій половыхъ органовъ. Мы уже упоминали, что молодой возрастъ способствуетъ появленію слѣдовъ половыхъ сношеній. Изъ статистики Tardieu видно, что измѣненія вульвы отъ лишенія дѣвственности появились 59 разъ у дѣвочекъ моложе 11 лѣтъ, 32 раза у дѣтей отъ 11 до 15 лѣтъ, 4 раза у дѣвушекъ отъ 15 до 20 лѣтъ и 1 разъ у женщины 41 года.

Я долженъ замѣтить, по результатамъ полученнымъ въ моемъ отдѣленіи госпиталѣ, что до 15 лѣтъ оказались у насъ большія цифры. чѣмъ у Tardieu. И это ничуть не удивительно. если помнить разницу въ половыхъ органахъ совокупляющихся.

(*) Я часто видѣлъ такіе примѣры у дѣтей 8 и 10 лѣтъ. Прим. автора.

Проникновенно
основывается
соотвѣтственно
другъ по дру
оставляетъ
органовъ, сов
женія половой
происхождені
Принципъ эт
приспособлен
легко и при
поврежденія
любowników
подруги. Ав
имѣлъ случа
щизнь, совок
разъ въ ден
и не предст
При такихъ
дыхъ дѣвуш
сохранивши
приводятъ
вѣтственнос
вершается
измѣненія
Эта
другого по
(*) Не
низма лашно
слѣдовательно
въ виду что
быть и т.

Происхожденіе вульварныхъ измѣненій отъ совокупленія основывается главнымъ образомъ на соответственности или несоответственности половыхъ органовъ. Разъ органы приходятся другъ на друга, физиологическій актъ совершается легко и не оставляетъ никакихъ слѣдовъ. Наоборотъ, при несоответствіи органовъ, совокупленіе затруднено и оставляетъ послѣ себя измѣненія половой щели. Таково, Мн. Г., главное основаніе для происхожденія и вульварныхъ и заднепроходныхъ измѣненій. Принципъ этотъ до такой степени вѣренъ, что при полной приспособленности половыхъ органовъ—совокупленіе совершается легко и при томъ безъ боли, безъ потери крови, иногда и безъ поврежденія дѣвственной плевы. Совокупленіе такъ легко, что любовникъ или мужъ перѣдко усумняется въ дѣвственности своей подруги. Авторы приводятъ множество такихъ примѣровъ, я самъ имѣлъ случай показывать вамъ (на клиническихъ лекціяхъ) женщинъ, совокупляющихся уже много лѣтъ и притомъ по нѣсколькимъ разъ въ день, и вѣсакі имѣющихъ цѣлую дѣвственную плеву и не представляющихъ никакихъ измѣненій половой щели. (*) При такихъ условіяхъ, возможно акушерское изслѣдованіе молодыхъ дѣвушекъ, беременность можетъ наступить у женщинъ, сохранившихъ признаки дѣвственности. Гинекологи и акушеры приводятъ много такихъ примѣровъ. Но, разъ является несоответственность въ объемѣ половыхъ органовъ,—совокупленіе совершается съ большимъ или меньшимъ трудомъ и оставляетъ измѣненія на половой щели.

Эта несоответственность можетъ зависѣть отъ одного или другого пола, будетъ-ли это слишкомъ объемистый penis, или же

(*) Не правильно-ли было-бы приписать такую свѣжесть особенности организма данной женщины. Въ этихъ случаяхъ рѣчь идетъ о публичныхъ женщинахъ, слѣдовательно объ соответственности половыхъ органовъ трудно разсуждать, имѣи въ виду что въ нѣсколько лѣтъ должны были переимѣниться цѣлая сотня, и можетъ быть и тысячи мужскихъ половыхъ органовъ. Прим. переводчика.

половая щель слишком узкая, или *musculus constr canni* слишком силенъ, или дѣвственная плева ненормально плотна. Нѣкоторыя ненормальности органа дѣйствуютъ также, какъ и несоотвѣтствіе органовъ, таковы: непроходимость вагины вертикальныя перемычки въ половой щели, высота промежности, благодаря которой уздечка у нѣкоторыхъ женщинъ очень близка къ лобковому сочлененію, чѣмъ существенно затрудняется введеніе мужскаго полового члена. Я долженъ упомянуть еще объ удлинненіи лоннаго сочлененія, что тоже можетъ препятствовать введенію *penis'a*.

Примѣръ этаго мы видимъ у больной на 12 койкѣ въ залѣ Cullerier. Передъ вами 16 лѣтня, рахитическая дѣвушка. Она начала ходить очень поздно, ноги ея нѣсколько искривлены вкнутри. Регулы и 1-е совокупленіе въ 15 лѣтъ. Съ тѣхъ поръ по нѣскольку разъ въ недѣлю дѣлались попытки къ совокупленію, но оно не могло быть совершенно исполнено и сопровождалось всегда значительной болью. При изслѣдованіи замѣчаемъ, что *vulva* отодвинута назадъ и кверху, образуя воронку. Палецъ, введенный для изслѣдованія матки удерживается нижними частями лоннаго сочлененія; необходимо обходить его къ низу, чтобы проникнуть во влагалище. Если-же подвинуть немного промежность къ низу, то палецъ легко проникаетъ во влагалище и можетъ ощущать крестцово-позвоночный уголъ, знакъ, что тазъ суженъ. Длина лоннаго сочлененія равняется 7 сантиметрамъ. Остается прибавить, что благодаря всѣмъ этимъ препятствіямъ для совокупленія, больная наша предается рукоблудію и содоміи.

Обращаю ваше вниманіе на то, что находимыя у взрослыхъ дѣвушекъ измѣненія, начинаются нерѣдко въ очень нѣжномъ возрастѣ. Больныя рассказываютъ, что будучи 8-ми, 10-ти или 12-ти лѣтъ онѣ подвергались совокупленію съ болѣе взрослымъ мужчиною.

Я могъ-бы привести много случаевъ растленія 8 или 9-ти лѣтнихъ дѣвочекъ чужими лицами, или-же дядей, братомъ и даже отцомъ. Но не хочу упирасть на эти факты преступной безнравственности; я отмѣтилъ ихъ, чтобы вамъ показать, что при судебно-медицинской экспертизѣ—вы должны допускать и подобную возможность, а также помнить, что растленіе могло быть совершено еще въ дѣтскомъ возрастѣ.

Таковы разные обстоятельства, сопутствующія растленію. Посмотримъ теперь въ чемъ заключается клиническая картина послѣдняго? Профессоръ А. Tardieu даетъ типическое описаніе растленія у дѣтей.

„Первый фактъ поражающій у дѣтей (подвергавшихся повторному совокупленію) это преждевременное развитіе половыхъ частей и ранняя зрѣлость, представляющая подчасъ рѣзкій контрастъ съ возрастомъ, ростомъ, силою и общимъ сложеніемъ дѣвочки. Такъ, мнѣ случалось наблюдать у дѣвочекъ 10 и 11 лѣтъ слѣдующіе признаки половой зрѣлости: лобокъ покрытый волосами, значительное развитіе грудей и т. дал. Большія губы бываютъ у нихъ утолщены и раздвинуты въ нижней своей части; между тѣмъ у дѣтей случается обыкновенно на оборотъ, т. е., большія губы полуоткрыты сверху. Малыя губы удлинены и нерѣдко выдаются изъ за большихъ. Похотникъ красный, выдающійся, полунапряженный; словомъ замѣчается вся характерная картина онанизма“.

„Но это не все: узкость частей и сопротивленіе лоннаго сочлененія полному введенію члена, разрушенію дѣвственной плевы,—ведутъ къ новымъ признакамъ. Гименъ отодвигается кзади и кверху, въ тоже время отодвигаются всѣ части образующія вульву. Отсюда возникаетъ родъ болѣе или менѣе глубокой воронки, способной воспринимать оконечность мужскаго полового члена и очень похожей на заднепроходную воронку при содоміи“.

„Воронка эта образуется изъ ладьеобразной ямочки, а не изъ промежности (Toulmouche). Длина ея можетъ достигнуть 2 или 3 сантиметровъ. Что касается дѣвственной плевы, то ее находятъ у вершины этой воронки; она можетъ быть цѣла, слегка надорвана, или же представлять маленькія язычки, которыхъ не слѣдуетъ смѣшивать съ настоящими *Carunculis myrtiformibus*; послѣдніе зависятъ не только отъ разрыва дѣвственной плевы но и отъ разрыва слизистой оболочки, выстилающей входъ во влагалище“.

„Интересно видѣть такую дѣвственную плеву, образующую у входа влагалища нѣчто въ родѣ дѣтской пупочки, центральное отверстіе которой окружено лоскутами *hymenis*; или же въ родѣ кольца, или циркулярной складки, тонкой какъ-бы истертой отъ повторнаго давленія“.

У болѣе зрѣлыхъ дѣвушекъ, при попыткахъ къ растленію, замѣчается чаще всего значительное расширеніе вульварнаго отверстія.

Дѣвственная плева бываетъ подчасъ расслаблена: она развѣвается (*folte*), такъ сказать, между наружными и глубокими частями.

Таковъ главный характеръ клиническихъ явленій замѣчаемыхъ послѣ лишенія дѣвственности. Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ вульварная воронка можетъ имѣть болѣе значительную длину.— Нѣсколько лѣтъ тому миѣ удалось наблюдать у одной негритянки воронку не короче 4 или 5 сантиметровъ. Дѣвушка эта, имѣя 12 лѣтъ отъ роду, подверглась растленію, совершенному послѣ многихъ неудачныхъ попытокъ крѣпкимъ мужчиною. Съ тѣхъ поръ миѣ встрѣчались и другіе примѣры. Между прочимъ я упомяну о больной 22 лѣтъ (изъ палаты *Natalis-Guillot*), представляющей очень длинную вульварную воронку. Но у нея имѣется только зачаточное влагалище, допускающее введеніе пальца не выше 3-хъ сантиметровъ.

И такъ. клиническіе признаки лишенія дѣвственности достаточно ясны и типичны для точнаго распознаванія.

Поэтому, не вдаваясь въ дифференціальную діагностику. я останавливаюсь только на клиническомъ значеніи этихъ измѣненій. Оно двухъ родовъ. — Во первыхъ, для судебного медика весьма важно рѣшить. подвергалась-ли прежде половымъ сношеніямъ— осматриваемая нынѣ особа. Во вторыхъ, врачъ практикъ найдетъ въ этихъ измѣненіяхъ причину трудности, болѣзненности, или даже невозможности супружескихъ сношеній; а также найдетъ указанія. какъ бѣдѣ помочь. Напр., если онъ встрѣтитъ неуступчивость дѣвственной плевы, или усиленный тонусъ *m-li constrictoris*, или суженіе входа во влагалище, — онъ надрѣзываетъ гименъ, вводитъ корнью съ бѣленой мазью, или расширяетъ влагалищный входъ.

Въ случаяхъ, когда супружескія сношенія стѣсняются высотой промежности. или же опусканіемъ или удлинненіемъ лоннаго сочлененія и т. под., то обыкновенныя терапевтическія средства не могутъ оказать пособія. Остается посоветывать женщинѣ принимать позу, способствующую совокупленію, напр., положеніе *à la vache*, боковое etc.

Я упустилъ изъ виду еще одну причину вульварныхъ измѣненій, а именно—проституцію,

Дѣйствуя такъ, я имѣлъ цѣлью поговорить спеціально объ этомъ предметѣ, вызвавшемъ много весьма разнообразныхъ мнѣній.

Вы знаете. что такое проституція и какъ она производится. Вы знаете, что она бываетъ то регламентированная, подверженная полицейскому надзору,—то свободная, тайная.

Я удовлетворюсь разборомъ факта, производитъ-ли проституція такіа измѣненія наружныхъ половыхъ органовъ женщины, по которымъ возможно-бы было опредѣлить ремесло осматриваемой?

По этому поводу у разныхъ авторовъ имѣются мнѣнія 2-хъ сортовъ. Одни допускаютъ, что проституція оставляетъ слѣды на вульвѣ, другіе же отрицаютъ это. Къ послѣднимъ принадлежитъ Parent-Duchâtelet. Авторъ этотъ, занимавшійся (какъ вамъ извѣстно) спеціально изученіемъ проституціи, пришелъ къ заключенію, что половыя части не представляютъ у проститутокъ никакого характеристичнаго измѣненія, никакихъ особенностей достойныхъ упоминанія.

Такъ, по случаю обширности vulvae и vaginae, принимаемой проституткамъ, P. D. говоритъ, что такое состояніе является нормально у очень многихъ женщинъ (не проститутокъ).

„Размѣры влагалища у женщинъ также разнообразны у разныхъ личностей, какъ и величина другихъ частей тѣла“. „Мнѣ случалось встрѣчать“, говоритъ онъ, „молодыхъ проститутокъ, недавно вступившихъ на это поприще, и имѣющихъ крайне объемистое влагалище и на оборотъ у женщинъ, практикующихъ уже 10, 15 и даже 20 лѣтъ, несмотря на самыя дѣятельныя половыя сношенія, — попадаются влагалище умеренныхъ размѣровъ, а половыя части не представляютъ ни малѣйшихъ измѣненій“.

Вы видите, что P.-Duchâtelet не приписываетъ никакихъ характеристическихъ для проституціи измѣненій влагалища или вульвы.

Изъ авторовъ, думающихъ иначе, я назову вамъ Д-ра Charpy, который въ трудѣ, опубликованномъ въ Annales de dermatologie etc, въ 1871—1872 гг., пытается изобразить измѣненія половыхъ органовъ у проститутокъ.

Авторъ этотъ, признавая, что описанныя имъ измѣненія не имѣютъ ничего особенно характеристичнаго, что ни одно изъ нихъ не можетъ служить исключительнымъ знакомъ публичной

женщины, но
тонгъ“ (час
большихъ и

По мнѣ
деніяхъ у пр
нія состоятъ
малыхъ губъ
губъ; подча
большихъ гу
въ очень ча
клитора; въ
частію отъ
наго развиті
влагалищной
жающихъ в

Къ эт
ширеніе вх
тканью, а
constrictore
входа, пре
боядное п
ническимъ
и нижней
отъ прежн
бухаетъ, б
грибовидн

Д-р
ченіемъ:
органахъ
и т. д.

женщины, но что они доказываютъ только „l'habitude de l'atonie“ (частыя половыя сношенія),—разсматриваетъ измѣненія большихъ и малыхъ губъ, похотника и мочевого отверстія.

По мнѣнію Д-ра Charpy, основанному на 800-хъ наблюденіяхъ у проститутокъ разнаго возраста,—спеціальныя измѣненія состоятъ въ гипертрофіи, а иногда въ атрофіи большихъ и малыхъ губъ; въ морщинистости и темномъ окрашиваніи малыхъ губъ; подчасъ въ шарообразномъ выступаніи нижнихъ частей большихъ губъ, зависящемъ отъ кистъ Бартолиновыхъ желѣзъ; въ очень частомъ высыпаніи лпшайнаго свойства; въ удлинненіи клитора; въ отодвиганіи мочевого отверстія кверху, зависящимъ частію отъ набуханія влагалищной луковицы, вслѣдствіе усиленнаго развитія въ ней эректильной ткани, частію отъ выпаденія влагалищной стѣнки, частію же отъ набуханія фолликулъ, окружающихъ входъ въ мочевой каналъ.

Къ этимъ измѣненіямъ Д-ръ Charpy прибавляетъ еще расширение входа во влагалище, вслѣдствіе потери эластичности ткани, а также отъ потери тонуса сжимателемъ входа (*m-lo constrictore cunni*); утолщеніе слизистой оболочки влагалищнаго входа, представляющей желтоватую, какъ-бы выдубленную; грибовидное набуханіе въ мочевомъ каналѣ, сопровождающееся хроническимъ воспаленіемъ мѣшочковъ, расположенныхъ у передней и нижней части канала, и зависящее отъ частаго трепія, особенно отъ прежнихъ уретритовъ. Отъ нихъ-то слизистая оболочка набухаетъ, рыхлѣетъ и выдается въ наружное отверстіе въ видѣ грибовидной, синеватой, легко изъязвляющейся массы.

Д-ръ Charpy оканчиваетъ свой трудъ слѣдующимъ заключеніемъ: „проститутка претерпѣваетъ въ своихъ дѣтородныхъ органахъ серію измѣненій, имѣющихъ противоположныя причины: атрофію отъ давленія и гипертрофію отъ раздраженія“.

Изученіе признаковъ, остающихся въ половыхъ органахъ женщины отъ проституціи, не такъ легко, Мм. Гг., какъ это кажется съ перваго раза.

Дѣйствительно, измѣненія эти не представляютъ яснаго и точнаго характера; кромѣ того существованіе ихъ крайне непостоянно и измѣнчиво. Отсутствуя у женщинъ, предающихся много лѣтъ усиленной проституціи, — онѣ появляются у дѣвушекъ 16 или 17 лѣтъ и, притомъ, не болѣе нѣсколькихъ мѣсяцевъ начавшихъ совокупленіе. Кромѣ того, вы находите ихъ не у однихъ проституттокъ, они попадаются и у кокотокъ и у замужнихъ женщинъ, какъ это я наблюдалъ въ теченіи семи лѣтъ, то въ госпиталѣ, то въ частной практикѣ. Вглядываясь въ эти признаки, вы убѣдитесь, что рядомъ съ женщинами, имѣющими по выраженію Д-ра Charpy, „l'habitude de l'amour“, предающимися ежедневно отъ 6 до 10 разъ совокупленію, а въ иные дни, какъ пнр., суббота и воскресенье, доходщими до 15 и даже до 20 соитій въ сутки, какъ это намъ рассказывали служанки погребковъ въ предместьяхъ Парижа и именно тѣхъ, которые расположены по близости военной школы, казармъ, или въ центрѣ рабочихъ кварталовъ, каковы Montmartre Clignancourt, La Villete, etc. etc., рядомъ съ такими женщинами, не представляющими подчасъ никакихъ измѣненій половыхъ органовъ, если онѣ не предаются онанизму, или сафизму, — вы найдете рѣзкія измѣненія у молодыхъ дѣвушекъ, совокупающихся не болѣе 4 или 6-ти мѣсяцевъ, у содержанокъ, у замужнихъ женщинъ, имѣющихъ половыя сношенія черезъ 2 или 3 дня, или разъ въ недѣлю.

По моимъ наблюденіямъ, волиѣ согласнымъ съ мнѣніемъ Parent-Duchâtelet, --- проституція, какъ торговля своимъ тѣломъ, не производитъ спеціальныхъ измѣненій половыхъ органовъ у женщины. И когда такія измѣненія существуютъ, то приходится

нѣтъ отысканія
довалиемъ эт
шнмися мн
3000 женщ

Вульва
морицистѣ
отнсають и
интментаціи.
достаточно р
лагалица с
выдающіеся
вульву у же
характеръ н
привлекли м

Призна
ными съ изм
что въ этихъ
беременными
ни какой-бы

Чену ж
новъ у нѣко

Какія

По мо
растѣ, при
и при част
нію. приход
измѣненіямъ
наго состо
частей

якъ отыскивать другую причину. Прежде чѣмъ заняться изслѣдованіемъ этой причины, я долженъ васъ познакомить со встрѣчавшимися мнѣ измѣненіями половыхъ органовъ при осмотрѣ 3000 женщинъ.

Вульва представляетъ особенный видъ. Большія губы плоче, морщинистѣе и объемистѣе, чѣмъ при нормальномъ состояніи; онѣ отвисаютъ и темнѣютъ болѣе, или менѣе, смотря по степени ихъ пигментаціи. Малыя губы нормальны. Входъ влагалища зіяющій, достаточно раздвинутъ бедра, чтобы увидѣть переднюю стѣнку влагалища съ выстоящими влагалищными складками, а также выдающіеся луковичы влагалища. Видъ этотъ весьма напоминаетъ вульву у женщины, бывшей много дѣтей. Таковъ клиническій характеръ измѣненій, замѣчавшійся въ тѣхъ случаяхъ, которые привлекли мое вниманіе.

Признаки эти я находилъ отдѣльными, или же соединенными съ измѣненіями отъ онанизма. Считаю лишнимъ говорить что въ этихъ наблюденіяхъ приведены только женщины, не бывшія беременными и не рожавшія, а также не имѣвшія ни маточной, ни какой-бы то нибыло специфической болѣзни.

Чему же приписать описанный выше видъ половыхъ органовъ у нѣкоторыхъ женщинъ?

Какія причины его обуславливаютъ?

По моему, это результатъ совокупленія въ молодомъ возрастѣ, при несоотвѣтствующихъ половыхъ органахъ съ муниною, и при частомъ повтореніи акта. Но, приписывая его совокупленію, приходится все таки искать какой-то располагающей къ измѣненіямъ идіосинкразіи у женщины, искать какого-то особеннаго состоянія половыхъ органовъ, усиленнаго развитія этихъ частей. Необходимо считаться со всеми вышеизложенными

обстоятельствами, чтобы постигнуть причину присутствія вульварныхъ измѣненій у однихъ женщинъ—и полного ихъ отсутствія у другихъ. Наконецъ, спрашивая такую женщину, вы узнаете, что въ очень молодомъ возрастѣ (14 до 16 лѣтъ) съ появленіемъ она имѣла уже слишкомъ сильно развитые половые органы. При дальнѣйшихъ вопросахъ, доискиваясь какой нибудь общей причины, вы убѣдитесь, что такое ненормальное развитіе половыхъ органовъ наступаетъ преимущественно на золотушной, лимфатической, или подагрической почвѣ.

Изъ вышесказаннаго заключаю, что проституція не оставляетъ специальныхъ слѣдовъ на половыхъ органахъ женщины.

Находимыя измѣненія, приписываемыя обыкновенно совокупленію, происходятъ главнымъ образомъ отъ усиленнаго развитія половыхъ частей, свойственнаго золотушнымъ, лимфатическимъ и подагрическимъ женщинамъ. Заключение это такъ вѣрно, что вы найдете описанныя измѣненія только у тѣхъ женщинъ, которыхъ половые органы представляли еще до перваго совокупленія, ненормальное, несоотвѣтствующее ихъ возрасту, развитіе.

И окончивъ, Мм. Гг., съ вульварными измѣненіями. мнѣ остается разсмотрѣть ненормальныя явленія въ заднемъ проходѣ.

III.

Измѣненія задняго прохода отъ содоміи.

Измѣненія задняго прохода отъ противуестественнаго акта содоміи также важны и интересны для врача, какъ и признаки разныхъ развратныхъ актовъ, находимые въ половыхъ органахъ женщины. И судебно-медицинское значеніе содомическихъ измѣненій, и сопутствующія имъ поврежденія задняго прохода и нижней части прямой кишки, и отвратительныя болѣзни, могущія имѣть такой гибельный исходъ для больного, —заставляютъ насъ особенно

внимательно относиться къ ясному опредѣленію ихъ клиническаго характера, чтобы поставить васъ въ возможность, точно и своевременно распознать болѣзни, — успѣшно бороться съ ея послѣдствіями, а также съ противуестественными актами, производящими всѣ эти измѣненія.

Какъ при изученіи вульварныхъ признаковъ, я не вхожу въ разсматриваніе паталогическихъ измѣненій органа, абсцессовъ, свищей, геморроя, выпаденія прямой кишки, стѣженія ея, стѣженія задняго прохода. Вы удивляетесь, можетъ быть, услыхавъ о стѣженія задняго прохода, вмѣстѣ съ болѣзнями нижней части recti. Страданіе это дѣйствительно очень рѣдко; случай, который я вамъ демонстрировалъ, быть можетъ единственный въ наукѣ. У меня не было времени рыться у разныхъ авторовъ и отыскивать, что они думаютъ по этому поводу. Какъ-бы то ни было, я упоминаю про этотъ случай, переданный для подробнаго изслѣдованія и лѣченія товарищу моему. Д-ру Pozzi, хирургу этого госпиталю.

Для тѣхъ изъ васъ, которымъ не удалось видѣть, я повторю въ нѣсколькихъ словахъ исторію этой больной. Дѣло идетъ о тридцатилѣтней женщинѣ, поступившей впервые въ мое отдѣленіе въ Апрѣлѣ 1880 года съ сифилитическими кондиломами вульвы и задняго прохода. Кромѣ кондиломъ, не было ничего особеннаго in ano. Въ февралѣ 1883 года она поступила опять по причинѣ стѣженія заднепроходнаго отверстія, вмѣстѣ съ полною потерей тонуса сфинктеромъ, а слѣдовательно съ постояннымъ непроизвольнымъ выдѣленіемъ испражнений и газовъ. Могу вамъ сообщить, что Д-ру Pozzi удалось вполне вылѣчить эту больную посредствомъ операціи.

Обходя измѣненія задняго прохода отъ травматическихъ причинъ, каковы: — введеніе инородныхъ тѣлъ, кусковъ дерева, стакановъ и проч., — приступаю къ признакамъ содоміи.

Но передъ этимъ упомяну о случаѣ, который мы видѣли сегодня утромъ въ залѣ Cullerier, — одной молодой женщиной, явившейся съ болѣзнію матки и поврежденіями задняго прохода, состоящими въ разрывахъ и изъязвленіяхъ слизистой оболочки, а также въ свищахъ по краямъ прохода. Травматизмъ этотъ произошелъ отъ насильственного введенія шампанской пробки, сдѣланнаго съ цѣлью облегчить coitus per anum съ тремя мужчинами. Упоминаю объ этомъ фактѣ, считая его рѣдкимъ и достойнымъ быть занесеннымъ въ исторію содоміи.

Содомія, Мм. Гр., состоитъ въ совокупленіи въ задній проходъ. Это общій терминъ для акта, каковъ-бы ни былъ полъ лицъ участвующихъ.

Педерастіей называется совокупленіе мужчины съ мужчиною-же (per anum). Поэтому различаютъ *активную и пассивную* педерастію. Намъ будетъ занимать только послѣдняя, которую я стану называть общимъ именемъ содоміи.

Еще въ началѣ этого курса я имѣлъ честь указать вамъ, что противуестественные половые акты составляли принадлежность всѣхъ вѣковъ, начиная съ самыхъ отдаленныхъ эпохъ и доходя до нашихъ временъ. Я упоминалъ имена тѣхъ врачей, которые занимались изученіемъ нашего предмета. — Не желая повторяться скажу только, что клиническое знакомство наше съ содоміей исходитъ главнымъ образомъ отъ профессора А. Tardieu.

Прежде всего намъ должны занять вопросы: часто-ли наблюдается содомія, и при какихъ условіяхъ? Затѣмъ намъ предстоитъ изучить клиническіе признаки, физическія и патологическія поврежденія, составляющія послѣдствія содоміи и дающія намъ возможность отличить послѣднюю отъ разныхъ болѣзненныхъ измѣненій задняго прохода.

Что со
убѣждаться в
многочисленны
постояннаго
въ неслыхан
частью по ин
венныхъ воз
или для удор
ры съ своей
ослабленныхъ
что женщина
совокупленіе
въ свою очер

Вы, М
моихъ клини
мыслию и ра

Повтор
усиливается

Факты,
леніи, прены
по малой мѣ
хода, свойст

При к
Каковы обст
рѣшенія кот

Содомі
тельствахъ,
бываетъ у

Что содомія весьма часта, вамъ не трудно ежедневно убѣждаться въ моемъ отдѣленіи. Къ сожалѣнію, основываясь на многочисленныхъ наблюденіяхъ, мнѣ приходится установить фактъ постояннаго усиленія этого порока. Сафизмъ и содомія учащаются въ неслыханныхъ размѣрахъ. Можно подумать, что женщина, частію по индифферентизму, частію доискиваясь новыхъ чувственныхъ возбужденій, частію желая поднять свой заработокъ, или для удовлетворенія постыднымъ привычкамъ мужчинъ, которые съ своей стороны ищутъ новыхъ ощущеній для возбужденія ослабленныхъ или отсутствующихъ уже половыхъ потребностей, что женщина, повторяю я, предпочитаетъ сафизмъ совокупленію, совокупленіе *per anum* — влагалищному совокупленію, — а мужчина, въ свою очередь, ищетъ по преимуществу, сафизма и содоміи.

Вы, Мм. Гг., слушающіе эти лекціи, вы участвующіе въ моихъ клиническихъ обходахъ, поражаетесь, я убѣжденъ, той-же мыслию и раздѣляете мои заключенія.

Повторяю, какова-бы ни была причина зла, частота его усиливается съ году на годъ.

Факты, собранные въ два послѣдніе года въ моемъ отдѣленіи, превышаютъ сотню случаевъ. А нынѣ, изъ 86 больныхъ, по малой мѣрѣ четверть представляетъ измѣненія задняго прохода, свойственныя содоміи.

При какихъ условіяхъ наблюдается содомія у женщины? Каковы обстоятельства благопріятствующія ей? Таковы вопросы, рѣшенія которыхъ я долженъ искать прежде всего.

Содомія у женщинъ представляется при другихъ обстоятельствахъ, при другихъ этиологическихъ условіяхъ, чѣмъ это бываетъ у мужчинъ.

У послѣднихъ педерастія имѣетъ спеціальную организацію, выработанную въ совершенствѣ, которая скрывается во мракѣ, существуетъ тѣмъ не менѣе *de facto*, такъ что ей можно дать названіе проституціи педерастической, живущей, по словамъ А. Tardieu, свои спеціальныя дома, своихъ вербовщиковъ въ публикѣ, извѣстныхъ подъ именемъ *metuшекъ* (tantes), свои привычки къ лѣни, воровству, пьянству, преступленіямъ, свой спеціальнѣйшій наружный видъ (*habitus*), проявляющейся въ особой манерѣ одѣваться и обвѣшивать украшеніями и драгоценностями, свойственными обыкновенно женщинамъ.—У мужчинъ эта организованная педерастія, эта педерастическая проституція, имѣетъ главною цѣлью наживу посредствомъ шантажа, и агентами проституціи бываютъ чаще всего воры и самые испорченныя молодые люди; цѣль педерастіи — спекулировать, играя страстями людей съ извращеннымъ нравственнымъ чувствомъ, или съ ослабленными умственными способностями, людей, которыхъ порочныя привычки развиты до крайней степени, подчинили себѣ все существо человека.

У женщинъ, напротивъ, содомія неслужитъ шантажу и рѣдко бываетъ прелюдіей къ воровству и другимъ преступленіямъ.

Замѣчаютъ безспорно содомію у проститутокъ; но у нихъ совокупленіе *per anum*, также какъ обыкновенное совокупленіе, равно какъ и сафизмъ—есть просто средство къ наживѣ, средство усилить плату, удовлетворяя извращеннымъ чувствамъ лицъ, стѣсняющихся скомпроментировать себя педерастіей и опасяющихся шантажа, и потому прибѣгающихъ къ женской содоміи.

Но, признавая, волишь, что содомія у проститутокъ часта, я долженъ вамъ заявить, что обыкновенно она встрѣчается чаще всего не у проститутокъ. Я находилъ признаки содоміи преимущественно у такихъ женщинъ, которыхъ привычки и социальное положеніе устраняютъ всякую мысль о возможности этихъ

противуестест
ннѣйшей за
биты въ ра
ковъ, бываю

Необхо
не составляе
сожалѣнію, с
заболѣванія,
которыя. пр
принять раз

Поэтом
я считаю до
сонутствуютъ
ислѣдованія
ислѣдованія

Для на
завѣщается
это, что же
же, она ус
подвергается
обратится к
своихъ извр

Изъ т
женщины,
только дв
моимъ быв

Посл
кажется",
часто при

противуестественныхъ сношеній, и если врачъ не изучилъ точно измѣненій задняго прохода отъ содоміи, то онъ рискуетъ ошибиться въ распознаваніи многихъ мѣстныхъ и общихъ принадлежностей, бывающихъ послѣдствіемъ этого акта.

Необходимо впрочемъ сознаться, что прогнѣть содомію не составляетъ непростительной ошибки для врача.— Но, къ сожалѣнію, содомія обуславливаетъ собою такія мѣстные и общие заболѣванія, частію перваго, частію пищеварительнаго аппарата,—которыя, при незнакомствѣ врача съ ихъ причиною—могутъ принять размѣры, угрожающіе здоровью и даже жизни женщины.

Поэтому, знакоми васъ съ клиническими явленіями содоміи, я считаю долгомъ указывать на тѣ спеціальныя условія, которыя сопутствуютъ этому акту и заставляютъ врача направить свои изслѣдованія на органъ, не подвергающійся при обыкновенныхъ изслѣдованіяхъ -- осмотру.

Для начала, Мм. Гг., прошу васъ помнить, что содомія замѣчается преимущественно у замужнихъ женщинъ. Потому ли это, что женщина не понимаетъ униженности этого акта, или-же, она уступаетъ нахальству и насилію; или-же, наконецъ, подвергается ей добровольно изъ ревности, изъ страха, что мужъ обратится къ мужской, или женской проституціи для насыщенія своихъ извращенныхъ половыхъ вкусовъ.

Изъ трехъ причинъ, обуславливающихъ содомію у замужней женщины, (незнаніе, грубости, ревности). А. Tardieu наблюдаетъ только двѣ первыя; что касается третьей, то она сообщена моимъ бывшимъ ученикомъ, Д-ромъ Bernard'омъ (de Cannes).

Послушаемъ сначала, что говоритъ Tardieu: „странно кажется“, пишетъ знаменитый профессоръ, „что содомія рождается часто при супружескихъ отношеніяхъ. Совокупленіе per anum

заступаетъ мѣсто естественнаго совокупленія, которое иногда вовсе не практиковалось. Въ другихъ случаяхъ. чрезъ нѣсколько дней послѣ брака, испорченные мушны приступаютъ къ своимъ женамъ съ требованіемъ содоміи. Постѣднія. благодаря своей невинности, или незнанію. сначала подвергаются содоміи; но послѣдствіи, слущаемыя болью, или предупрежденныя подругою, или матерью. — онѣ начинаютъ болѣе или менѣе настойчиво отказываться отъ акта, который съ этого времени можетъ совершаться только насильственно. Благодаря жалобамъ жены, или ея семейства, въ это вступается законъ и такъ какъ содомія, особенно совершаемая съ насиліемъ, считается преступленіемъ, нарушеніемъ стыдливости женщины, подающимъ поводъ къ разводу то судебный врачъ приглашается обыкновенно для провѣрки заявляемыхъ фактовъ". — Этотъ врачебный осмотръ долженъ, Мм. Гг., точно обозначить не только существованіе, или отсутствіе признаковъ содоміи, но въ немъ необходимо еще выяснить совершались-ли или нѣтъ естественныя половыя сношенія, а также описать строеніе половыхъ органовъ и уклоненія отъ нормы, если таковыя представляются.

Словомъ, осмотръ этотъ долженъ основываться на полномъ знакомствѣ съ изложенными уже измѣненіями половой щели, и съ измѣненіями задняго прохода, о которыхъ предстоитъ рѣчь.

Уже одни судебныя послѣдствія содоміи указываютъ на серьезную обязанность для врача точнаго изученія признаковъ послѣдней.

Третье условіе. при которомъ замужняя женщина предается содоміи, прошло повидимому не замѣченнымъ у судебныхъ врачей, по крайней мѣрѣ, оно не упоминается въ ихъ трудахъ. Я имѣлъ случай убѣдиться, что одна любовница, предавалась изъ ревности — содоміи. несмотря на полнѣйшее отвращеніе къ этому акту; но мнѣ не удавалось наблюдать содоміи, вынужденной ревностію у замужней женщины. —

Поэтому
превосходнымъ

„Два г
къ 28 лѣтне

въ нижнихъ
рашекъ. Ник

или мочеиспу
истеченія 3

ностей, быст
покая и холо

Заинтересова
вать больную

нужь совокуп
она, когда м

живѣйшее от
дасть ужасн

отказывать м
насыщать св

указать ей
творять пор

этого парали

Считаю
одно: — рѣш

всегда отъ
параличей.

Фактъ
роль, не он

рода призн
чали никог

вожлупей

Поэтому меня заинтересовалъ фактъ, переданный моимъ превосходнымъ товарищемъ Д-ромъ Bernard'омъ (de Cannes).

„Два года тому назадъ“, пишетъ онъ. „меня пригласили къ 28 лѣтней замужней дамѣ. Она жаловалась на бродячія боли въ нижнихъ конечностяхъ, на ощущеніи холода и ползанія мурашекъ. Никакихъ уклоненій отъ нормы со стороны испражнений или мочеиспусканія. Я назначилъ возбуждающія втиранія. По истеченіи 3 дней выяснился полный параличъ нижнихъ конечностей, быстро исчезнувшій отъ втираній стрихнинной мази, покоя и холодныхъ душей: мѣсяць спустя, возобновленіе паралича. Заинтересованный этимъ фактомъ, начинаю подробно расспрашивать больную и добиваюсь сознанія, что уже нѣсколько лѣтъ мужъ совокупляется съ нею per anum. И каждый разъ, говоритъ она, когда мужъ предается этому акту, возбуждающему въ ней живѣйшее отвращеніе, — наступаетъ у нея paraplegia. Она ожидаетъ ужасныхъ послѣдствій для своего здоровья, но не желаетъ отказывать мужу изъ боязни, что онъ станетъ въ другомъ мѣстѣ насыщать свои порочныя наклонности; поэтому она меня проситъ указать ей средство, которое дало-бы ей возможность удовлетворять порочнымъ привычкамъ своего мужа, не заболѣвая послѣ этого параличами“.

Считаю лишнимъ добавлять, что врачъ могъ посоветывать одно: —рѣшительно прекратить содомію и избавиться разъ навсегда отъ этихъ, въ полномъ смыслѣ слова, перемежающихся параличей.

Фактъ этотъ, гдѣ ревность играетъ толкающую къ пороку роль, не оказался единичнымъ. Я получилъ нѣсколько такого рода признаній. Но чего ни я, ни даже А. Tardieu не замѣчали никогда, это перваго припадка, это паралегіи, сопровождающей содомію.

Я еще поговорю о ней, когда мы станемъ разсматривать общія явленія, слѣдующія за содоміей.

Иногда содомія замѣчается еще при слѣдующихъ обстоятельствахъ: при аномалии половыхъ органовъ женщины, напимѣрь, при непроходимости вульвы и влагалища, при рубцахъ суживающихъ влагалищный входъ, при такомъ сращеніи малыхъ губъ, что остается только болѣе или менѣе длинный и полурастяжимый каналъ, нѣчто въ родѣ рудиментарнаго влагалища, словомъ, во многихъ случаяхъ, когда естественное совокупленіе физически невозможно, оно замѣняется совокупленіемъ *per anum*.

При означенныхъ патологическихъ измѣненіяхъ влагалища, содомія становится, такъ сказать, правиломъ. Я имѣю множество подобныхъ наблюденій. Достаточно будетъ привести вамъ слѣдующее: вспомните дѣвушку 15 лѣтъ, находящуюся въ залѣ N.-Guillot. У нея, слѣдствіемъ ли операціи, произведенной въ дѣтствѣ, или же какъ врожденный порокъ, — представляется сращеніе малыхъ губъ, сплошное сверху и снизу, но имѣющее въ серединѣ отверстіе въ 2 сантиметра, соответствующее входу во влагалище. Палецъ проникаетъ черезъ это отверстіе и убѣждаетъ насъ въ существованіи матки. Обыкновенное маточное зеркало не пролѣзаетъ; приходится пользоваться *speculo ani*, чтобы разсмотрѣть нормальное маточное рыльце. Этой молодой дѣвушкѣ невозможно совокупляться *per vaginam*, поэтому она предоставила своему любовнику — *anus*, и принуждена была поступить въ госпиталь съ твердымъ шанкеромъ передней поверхности задняго прохода. Вульва ея усеяна кондиломами. Задній проходъ очень расширенъ, такъ что свободно пропускаетъ два пальца, раздвигая которые легко наблюдать рыхлую, красную и изъязвленную слизистую оболочку прямой кишки. Кромѣ громадной растяжимости *anusa*, замѣчается изглаживаніе его лучевыхъ скла-

докъ; тонусъ
ослабѣлъ. И
дѣленіе газ
выраженной
per anum

Содом
ненности
вульвы, ву.
заболѣвані
можно, или
предпочита
его любви
деній: част
о содоміи,
номинаніем
іюмъ, о к
этой больн
Даже изсл
созналась,
галищаго

У д
чается по
ко выраж

Нак
рыхъ вы
кахъ жен
лодыл дѣ
ся совоку
зомъ, тѣ
этихъ на
чинѣ он

докъ; тонусъ сфинктера исчезъ, или, по крайней мѣрѣ очень ослабѣлъ. и больная съ трудомъ удерживаетъ испражненія. Выделение газовъ непроизвольное. У этой больной, мы не находимъ выраженной заднепроходной воронки. Со времени совокупленія per anum дѣвушка жалуется на боль и жженіе при испражненіи.

Содомія наблюдается еще у женщинъ, страдающихъ болѣзненностію вульвы, влагалища и матки, т. е. при гиперестезіяхъ вульвы, вульвизмѣ, вагинитахъ и метритахъ. Если при этомъ заболѣваніи совокупленіе очень болѣзненно, а иногда и невозможно, или же возбуждаетъ возвраты болѣзни,—то женщина предпочитаетъ содомію, лишь-бы какъ нибудь удовлетворить своего любовника или мужа. Я собралъ множество такихъ наблюденій: часть ихъ опубликована въ лекціяхъ моихъ 1881 года о содоміи, другая часть будетъ издана позже. Я ограничусь напоминаніемъ вамъ о дѣвужкѣ съ удлинненнымъ лоннымъ сочлененіемъ, о которой мы говорили, разбирая маточныя измѣненія. У этой больной влагалищное совокупленіе было почти невозможно. Даже изслѣдованіе представляло сильную боль и больная легко созналась, что совокупленіе per anum для нея много легче влагалищнаго,—почему она и предпочитаетъ первое.

У другой больной, находящейся въ той же залѣ, замѣчается подобное-же развитіе лонныхъ костей, но оно менѣе рѣзко выражено.

Наконецъ, Мм. Гг., есть спеціальныя условія, при которыхъ вы встрѣтите содомію; я говорю о нравахъ, о привычкахъ женщинъ нѣкоторыхъ странъ Европы, Азии, Африки. Молодыя дѣвушки въ этихъ мѣстностяхъ предпочитаютъ предаваться совокупленію per anum. Онѣ менѣе рискуютъ такимъ образомъ, такъ какъ потеря дѣвственности до брака считается у этихъ народовъ величайшимъ порокомъ. Но этой ли только причиной онѣ предаются содоміи, или имѣются еще другіе мотивы,

я не могу рѣшить. Но, знакомя васъ съ вышеизложеннымъ, я повторяю собственные слова, я привожу объясненіе тѣхъ иностранныхъ дѣвушекъ, у которыхъ мнѣ приходилось діагносцировать содомію. Нѣкоторые изъ васъ вспомнятъ, можетъ быть, семнадцати лѣтнюю итальянку, лежавшую у насъ въ залѣ Sullerger. Она предавалась съ 11 лѣтъ содоміи. Лишеніе дѣвственности наступило у нея только 10 мѣсяцевъ тому назадъ. Тогда именно она заболѣла сифилисомъ, съ которымъ явилась сюда.

Что касается возраста, въ которомъ встрѣчается содомія, то вы ее встрѣтите отъ 8 до 50 и болѣе лѣтъ, словомъ—во всякомъ возрастѣ; но чаще всего отъ 16 до 25 лѣтъ. У насъ имѣется одно только наблюденіе у женщины 39 лѣтъ—я вспомнилъ еще о женщинѣ 26 лѣтъ, представлявшей вульварныя измѣненія отъ рукоблудія, сафизма и труднаго лишенія дѣвственности (несоотвѣтственность половыхъ органовъ), а вмѣстѣ съ съ этимъ и измѣненія задняго прохода отъ содоміи. Особа эта созналась безъ всякаго колебанія, что признаки содоміи относятся къ 8 лѣтнему ея возрасту, съ котораго родной отецъ сталъ совершать съ нею совокупленіе и *per anum* и *per vaginam*.

Зависитъ-ли это отъ молодого возраста, свойственнаго вообще женщинамъ, помѣщающимся въ этомъ госпиталѣ, или же вслѣдствіе другихъ вышеозначенныхъ обстоятельствъ,—что содомія встрѣчается преимущественно между 16 и 25 годами, я не берусь рѣшить и дѣлюсь съ вами только фактомъ, наблюдавшимся постоянно.—Вамъ предстоитъ провѣрить личными наблюденіями, не впалъ-ли я въ невольную ошибку.

Познакомившись съ обстоятельствами, при которыхъ чаще всего встрѣчается содомія, я могу перейти къ разсмотрѣнію клиническихъ ея признаковъ, которые дадутъ вамъ возможность правильно діагносцировать эту порочную привычку.

Признаки эт
торіальныхъ слѣд
сифизму и рукобл
тористическія изм
оставленная поро
и содомія произ
прямой кишки,
хженіи, что въ
существованіе, д

Каковы-ж
ненія и дающіе

Они край
подавно практ
насиліея она
соотвѣтственно

Чрезвыч
обстоятельств
въ состояніи
ковъ содоміи

По мнѣ
что только
ческіе при
полнѣйшаго
ніе ими, п
фактовъ.

Но
ныхъ пол
нія, прич
необходим

Признаки эти, по словамъ А. Tardieu, состоятъ въ матеріальныхъ слѣдахъ совершающагося акта. Подобно растленію, сафизму и рукоблудію, производящимъ на половой щели характеристическія измѣненія. до такой степени ясныя, что даже и оставленная порочная привычка не легко можетъ быть скрыта, и содомія производитъ въ заднемъ проходѣ, въ нижнихъ частяхъ прямой кишки, въ сосѣднихъ съ anus'омъ частяхъ—такія измѣненія, что въ большинствѣ случаевъ врачъ можетъ опредѣлить существованіе, давность и даже частоту содоміи.

Каковы-же физическіе признаки, характеризующіе эти измѣненія и дающіе право приписать ихъ именно содоміи?

Они крайне разнообразны, смотря по тому, давно-ли, или недавно практикуется совокупленіе, съ большимъ или съ меньшимъ насиліемъ она совершалась, наконецъ, смотря по объему и общей соотвѣтственности дѣйствующихъ органовъ.

Чрезвычайно важно, Мм. Гг., считаться со всѣми этими обстоятельствами, потому что только взвѣсивши ихъ вполнѣ въ состояніи будете точно оцѣнить значеніе имѣющихся признаковъ содоміи.

По мѣрѣ дальнѣйшаго изученія предмета, вы сами увидите, что только группируя и сближая разные доступные врачу физическіе признаки, вы можете добиться и точной діагностики и полнѣйшаго сознанія отъ больныхъ, несмотря на упрямое отрицаніе ими, при первыхъ вашихъ вопросахъ,—самыхъ очевидныхъ фактовъ.

Но вамъ слѣдуетъ знать, Мм. Гг., что хотя сознаніе больныхъ получается большею частію не трудно, бываютъ и исключенія, причину которыхъ вамъ легко понять. Тѣмъ не менѣе, врачу необходимо добиться полного сознанія, не для подтвержденія

діагностики, но для разъясненія условий. породивших содомію; поэтому я рекомендую вамъ быть крайне терпѣливыми, осторожными и вмѣстѣ ловкими, если вы желаете получить отъ больной откровенные отвѣты. Спрашивая женщинъ, которыхъ подозреваете необходимо быть мягкимъ и заслужить прежде всего ихъ довѣріе. Далѣе разнообразьте ваши вопросы. замѣчайте, что предполагаемый актъ былъ совершенъ. по всей вѣроятности. случайно, или по ошибкѣ, или во время сна. Если продолжается заперательство, то врачъ разспрашиваетъ какъ именно совершаетъ женщина совокупленіе. проситъ принять позы, требуемыя для совершенія этого акта мужемъ или любовникомъ. Тогда женщина принимаетъ большую частію позу. облегчающую совокупленіе per anum, т. е. помѣщаясь на спинѣ, поднимаетъ слишкомъ высоко ноги, или-же ложиться à la vache.

Продолжая разспросы съ мягкостію, съ убѣжденіемъ, врачъ добивается всегда истины, особенно если дѣло идетъ о замужней женщинѣ, или любовницѣ. — Имъ нѣтъ интереса обманывать врача; онѣ стыдятся только самаго акта.

Иныя трудности представляются врачу при необходимости добиться сознанія отъ проститутки. отъ застарѣлой содомистки. Она имѣетъ цѣль скрывать порочные акты. дающіе ей хлѣбъ: поэтому она энергически отрицаетъ содомію, несмотря на самые рѣзкіе признаки. У проститутокъ вы встрѣтите такія же затрудненія, какія испыталъ A Tardieu, при разспросахъ и изслѣдованіи педерастовъ, которые имѣютъ цѣлью не только скрыть свою постыдную привычку, но вмѣстѣ съ тѣмъ и избѣжать кары закона. Вы знаете уже, что пассивный педерастъ часто пользуется своимъ ремесломъ для воровства, шантажа и даже убійства. Въ такихъ случаяхъ сознаніе не особенно важно. Если дѣло идетъ о привычной содоміи, то измѣненія задняго прохода дѣлають діагностику несомнѣнной.

Какъ-бы т
ченію сознанія,
плется уже болѣ
димы для оцѣн
равно какъ
этого акта.

Я обязан
женными рассу
Но знаю удал
противныя сто
при разрѣшені

Ко всѣм
расужденіямъ
мочь-бы приб
такъ хорошо
къ ней обрат
для педераст
содоміи. При
при изслѣдо
позу, облегч
спинѣ съ си
стечени, си
женщины à

Раздѣ
нѣтъ-ли п
содоміи. За
помощью с
измѣненія
врачъ дол
жать сосре
дичныхъ м

Какъ-бы то ни было, врачъ долженъ стремиться къ получению сознанія, потому что, разъ сознавшись, женщина не стѣсняется уже болѣе въ сообщенія всѣхъ свѣдѣній, которыя необходимы для оцѣнки діагностическаго значенія признаковъ содоміи, равно какъ и обстоятельствъ, способствующихъ совершенію этого акта.

Я обязанъ былъ, Мм. Гг., подѣлиться съ вами вышеизложенными разсужденіями, до разсмотрѣнія клиническихъ измѣненій. Не знаю удалось-ли мнѣ смилчить, по мѣрѣ возможности тѣ противныя стороны предмета, которые такъ часто встрѣчаются при разрѣшеніи нашей задачи.

Ко всѣмъ этимъ этиологическимъ подробностямъ, ко всѣмъ разсужденіямъ о способахъ успѣшно разсиранивать больныхъ, я могъ-бы прибавить методику изслѣдованія *anus'a*; но послѣдняя такъ хорошо изложена у Tardieu, что желающіе могутъ прямо къ ней обратиться. Наконецъ, большинство правилъ, годныхъ для педерастовъ, рѣдко приложимы при изслѣдованіи женской содоміи. Признаки послѣдней обнаруживаются обыкновенно, если при изслѣдованіи половыхъ органовъ, заставить женщину принять позу, облегчающую осмотръ задняго прохода (т. е., на боку, на спинѣ съ сильно приподнятыми ногами). Но, для точной оцѣнки степени, силы и протяженія поврежденій—необходимо положеніе женщины *à la vache*.

Раздвинувъ ягодицы больной, врачъ обращаетъ вниманіе, имѣтъ-ли наружныхъ измѣненій задняго прохода, свойственныхъ содоміи. Затѣмъ, расширивъ отверстіе прохода пальцами, или съ помощью *speculi ani*, или оцупывая проходъ, онъ оцѣниваетъ измѣненія слизистой оболочки и сфинктера. Въ изслѣдованіи врачъ долженъ приступать постепенно и осторожно, чтобы избѣжать сокращенія мускула поднимающаго задній проходъ и ягодичныхъ мускуловъ. Еще болѣе нужно терпѣнія и осторожности

если необходимо посредствомъ продолжительности изслѣдованія, добиться чтобы мускулы эти перестали сокращаться. Вамъ необходимо знать, что нѣкоторыя женщины, преимущественно проститутки, подобно застарѣлымъ недерастамъ—изъ всѣхъ силъ стараются затруднить осмотръ заднепроходной области, энергическимъ сокращеніемъ *musculi levatoris ani*. равно какъ и ягодичныхъ мускуловъ. Но, повторяю вамъ, терпѣніе и настойчивость врача легко побѣждаютъ это сопротивленіе и даютъ возможность убѣдиться въ существованіи признаковъ содоміи. къ разсмотрѣнію которыхъ мы приступимъ немедленно.

Я сказалъ выше, что измѣненія, слѣдующія за совокупленіемъ *per anum*, крайне разнообразны. Причины, о которыхъ было говорено при обзорѣ признаковъ въ половыхъ органахъ отъ лишенія дѣвственности, отъ совокупленія *per vaginam*, не теряютъ значенія и при заднепроходномъ совокупленіи. Подобно первымъ, измѣненія *anus'a* разнообразны смотря по тому давно-ли, или не давно совершается содомія, а также сопровождается ли она большимъ, или меньшимъ насиліемъ, часто-ли повторяется, временно-ли, или постоянно, и притомъ, есть-ли соотвѣтственность въ органахъ лицъ, участвующихъ въ актѣ, или ея нѣтъ.

Не слѣдуетъ забывать ни одного изъ этихъ обстоятельствъ, если желаете правильно оцѣнить разные измѣненія заднего прохода. Упустивъ что нибудь изъ виду, врачъ не только рискуетъ проглядѣть содомію и слѣдующія за ней болѣзни, но и совершить ошибку, крайне вредную для его собственнаго положенія въ обществѣ и гибельную для тѣхъ лицъ, которые подвергнутся незаслуженному наказанію, или, по малой мѣрѣ, пострадаютъ отъ несправедливыхъ подозрѣній.

По этому врачъ обязанъ крайне внимательно относиться къ этой наукѣ; она требуетъ величайшей точности при отыскиваніи

клиническихъ и
нѣ, вытекающихъ
высшей степени

Каковы же
что они различ
той давности
болѣе или же
большую или
слѣдняя покр
ныя и даже
прохода разры
воспаленіе по
кровянисто се
ного прохода

стойна, или
выдѣленія ка
піе. Такія же
ственности о
Если къ вы
женщины си
титъ — вдав
ронки, подо
происхожден

Прич
ного, сове
penis сли
тивленіе с
видимъ ну
ную. Вел
щели, по

клиническихъ признаковъ, при наложеніи діагностики. Заключение, вытекающія изъ подобаго изслѣдованія должны быть въ высшей степени ясны и точны.

Каковы же клиническіе признаки содоміи? Я сказалъ уже, что они различны, смотря по частотѣ и по большей или меньшей давности совокупленія. Если содомія свѣжа, то замѣчаютъ болѣе или менѣе сильную красноту задняго прохода, а также большую или меньшую набухлость слизистой оболочки ані. Последняя покрыта ссадинами, кровоточива, иногда глубоко надорвана и даже изъязвлена. Нерѣдко находятъ вокругъ задняго прохода разрывы, синеватое окрашиваніе, кровоподтеки и даже воспаленіе подлежащей кѣтчатки, абсцессы и свищи. Иногда кровянисто серозная и гнойная жидкость омываетъ область задняго прохода, крайне болѣзненную при ощупываніи. Боль постоянна, или временна; она проявляется преимущественно при выдѣленіи кала. Женщина испытываетъ тогда сильнѣйшее жжение. Такія явленія наблюдаются особенно часто, при несоотвѣстности органовъ, или при много-кратномъ повтореніи содоміи. Если къ вышеизложеннымъ обстоятельствамъ прибавятся еще у женщины сильное сопротивленіе сфинктера, то вы можете встрѣтить — вдавленіе заднепроходной области, начало образованія воронки, подобной воронкѣ половой щели, обязанной также своимъ происхожденіемъ — *tonus constrictoris cunni*.

Причины этихъ 2 измѣненій, вульварнаго и задне-проходнаго, совершенно одинаковы. Воронка *vulvae* указываетъ, что *penis* слишкомъ великъ для половой щели, или же, что сопротивленіе сожмателя влагалищнаго входа усилено; почему мы и видимъ вульву отодвинутую кзади и кверху, уздечку — изглаженную. Вслѣдствіе этого отодвиганія составныхъ частей половой щели, получается каналъ, названный вульварною воронкою.

Тоже и о заднемъ проходѣ. Разъ совокупленіе per anum затруднено, и не смотря на постоянную трудность (будетъ-ли это отъ усиленнаго толуса, или отъ несоотвѣтствія половыхъ органовъ) часто повторяется, то задній проходъ съ окружающими его частями поднимается кверху и образуется воронка. Отсюда становится понятнымъ, что, если предсказывается обратное, т. е., если сфинктеръ легко пропускаетъ, если отверстіе задняго прохода свободно-проходимо для полового члена. — то воронка не образуется вовсе. Все эти признаки будутъ также отсутствовать, какъ это мы видѣли, при легкомъ лишеніи дѣвственности.

Какъ-бы то ни было, Мм. Гг., изъ объясненій, приведенныхъ выше, изъ аналогіи, только что разсмотрѣнной, — вытекаетъ фактъ, что заднепроходная воронка есть признакъ труднаго и притомъ часто повторяющагося совокупленія. Неудивительно поэтому, что признакъ этотъ нерѣдко отсутствуетъ при свѣжей содоміи, почему онъ и не долженъ считаться характернымъ для этого факта. Повторяю это такъ настойчиво, съ цѣлью уберечь васъ отъ грубыхъ ошибокъ.

Свѣжая содомія рѣдко наблюдается въ городѣ и вы знаете этому причины. Женщины только тогда совѣтуются со врачомъ, если страданія слишкомъ сильны, невыносимы: если припадки слишкомъ тяжелы и опасны. Однако мнѣ удалось собрать нѣсколько наблюденій, изъ которыхъ приведу слѣдующее.

Во время коммуны я былъ вытребованъ (выражаюсь потребованъ, потому что получилъ офиціальное предписаніе) прибыть немедленно въ казармы на набережной Орее, чтобы подать пособіе женщинамъ отъ сильнѣйшаго кровотеченія ex ano. Я подумалъ сначала о разрывѣ геморроидальныхъ венъ; но при осмотрѣ больной оказалось, что anus представлялъ нѣсколько лучевыхъ надрывовъ, что слизистая оболочка была тоже мѣстами

надорвана и что
Кровотеченіе оказ
на задній проходъ

Не находя
видя признаки т
я тотчасъ заход
совокупленіе, въ
никъ казармы,
анитъ съ этой же
введенія половых
длался обморокъ

Свѣжая со
преимущественно
чтобы я не пок
пны являются
ства, прекрасны
щины въ залѣ
илкаго шпакр
анитъ служить
ческихъ болѣз
случай триппер
Natalis -- Guil
съ любовником
сгнанный въ
работъ о цед
ходномъ трип
мушиною стра
(заднепроходн
и у моего бо
ніемъ изъ за

надорвана и что окружающіе покровы были синеваго цвѣта. Кровотеченіе оказалось незначительнымъ; его уменьшило давленіе на задній проходъ, произведенное окружающими.

Не находя никакой геморроидальной шишки, напротивъ, видя признаки травматическаго поврежденія задняго прохода, — я тотчасъ заподозрилъ, что причиною было противоестественное совокупленіе, въ чемъ и сознался, потребовавшій меня начальникъ казармы, объяснивъ, что онъ желалъ совокупиться *per anum* съ этою женщиной и что послѣ труднаго и насильственнаго введенія полового члена въ задній проходъ, съ женщиною сдѣлался обморокъ и кровотеченіе (*ex ano*).

Свѣжая содомія наблюдается обыкновенно въ госпиталяхъ, преимущественно въ госпиталѣ *Lourcine*. Не проходитъ недѣли, чтобы я не показывалъ вамъ одинъ или два случая ея. Больныя являются *cum rectitide acuta*, травматическаго свойства, прекрасный примѣръ которой вы можете наблюдать у женщины въ залѣ *Cullerier*; или же съ прищадками твердаго, или мягкаго шанкра. Необходимо помнить, что и совокупленіе *per anum* служитъ къ распространенію сифилитическихъ и венерическихъ болѣзней. Такъ я вамъ показывалъ довольно рѣдкій случай триппера задняго прохода, полученнаго больною изъ залы *Natalis — Guillot*, вслѣдствіе постоянныхъ совокупленій *per anum* съ любовникомъ, имѣвшимъ трипперъ. Случай этотъ не единственный въ наукѣ: такой фактъ помѣченъ у *A. Tardieu* въ его работѣ о педерастіи. Авторъ этотъ рассказываетъ о заднепроходномъ трипперѣ, вслѣдствіе завѣдомой педерастіи съ другимъ мужчиною страдавшимъ уретральнымъ трипперомъ. — Болѣзнь эта (заднепроходный трипперъ) характеризировалась у *Tardieu*, какъ и у моего больного, довольно обильнымъ, зеленоватымъ истеченіемъ изъ задняго прохода.

У больных моего отдѣленія есть еще одна особенность, объясняющая вамъ почему свѣжая содомія наблюдается у насъ довольно часто. Большинство такихъ больныхъ страдаютъ болѣзнями вульвы, влагалища, или матки. Болѣзни эти затрудняютъ совокупленіе *per vaginam*, почему женщина и предпочитаетъ содомію, опасаясь полнымъ отказомъ разсердить своего любовника и заставить его обратиться къ другой женщинѣ. Факты эти до такой степени характеристичны, что можно высказать слѣдующее положеніе: всякій разъ, когда у женщины имѣется страданіе половых органовъ, затрудняющее естественное совокупленіе, врачу слѣдуетъ осмотрѣть заднепроходную область и убѣдиться, нѣтъ ли тамъ признаковъ содоміи. Въ госпиталѣ подозрѣніе его подтвердится во многихъ случаяхъ, да и въ частной практикѣ найдутся не разъ признаки содоміи. Я собралъ много такихъ наблюденій.

Таковы, Мм. Гг., признаки свѣжей временной содоміи. Посмотримъ теперь, чѣмъ характеризуется содомія привычная, давняя, застарѣлая?

Если содомическій актъ привыченъ и частъ, если онъ производится уже нѣсколько мѣсяцевъ, или нѣсколько лѣтъ, то не ищите признаковъ травматическаго воспаленія *anus'a*: они отсутствуютъ. Вы не встрѣтите ни воспаленія слизистой оболочки задняго прохода, ни разрывовъ этой оболочки, ни подтековъ на покровахъ, ни фистулезныхъ абсцессовъ. Напротивъ, появляются иные признаки, прекрасно описанные профессоромъ А. Tardieu, и состоящіе въ заднепроходной воронкѣ, въ расслабленіи сфинктера, въ изглаживаніи лучевыхъ складокъ заднепроходнаго отверстія, въ расширеніи этого отверстія, въ невозможности удержать газы и калъ. Станемъ разсматривать эти признаки порознь, съ цѣлью уловить ихъ существенныя особенности.

Начнемъ съ
наблюдателей: с
значеніе. — За в
Collineau, Раг
профессоръ Броу

Уже одно
Гг., что во од
она отсутствует

Я познак
нія, разбирая
новлено, что
сфинктера, ч
Повторяю вамъ
ченныя услов
недерастія и
Tardieu, как
подробно изу
принимаетъ
статистикѣ
разъ изъ ст

Изъ
дующіе. Г
шой къ на
Большая с
Дна или
тѣхъ пор

Вор
изверху р
нишекъ.

Начнемъ съ воронки. Признакъ этотъ давно уже поражалъ наблюдателей: одни отрицали вовсе, другіе преувеличивали его значеніе. — За воронку стоялъ Cullerier, противъ Tascuemin'a, Collineau, Parent-Duchâtelet. Нынѣ ея почти не признаетъ профессоръ Brouardel.

Уже одно разнорѣчіе этихъ мнѣній доказываетъ намъ, Мм. Гг., что во однихъ случаяхъ — воронка бываетъ, въ другихъ-же она отсутствуетъ.

Я познакомилъ васъ съ причинами перваго и втораго явленія, разбирая условія появленія воронки, при чемъ было установлено, что воронка есть результатъ частію — сопротивленія сфинктера, частію же несоотвѣтственности въ объемъ органовъ. Повторяю вамъ, всякій разъ, какъ имѣются, или имѣлись означенныя условія, вы навѣрное встрѣтите воронку, будетъ-ли это педерастія или содомія, т. е. и у мужчинъ и у женщинъ. Tardieu, какъ вамъ извѣстно, въ трудѣ своемъ о педерастіи, подробно изучилъ этотъ признакъ и въ большинствѣ случаевъ принимаетъ его присутствіе. Я раздѣляю это мнѣніе; по моей статистикѣ оказывается, что воронка существуетъ въ 60 до 80 разъ изъ ста случаевъ.

Изъ многихъ примѣровъ, позвольте мнѣ привести три слѣдующіе. Первый относится къ 26 лѣтней служанкѣ, поступившей къ намъ по причинѣ твердаго шланкра задняго прохода. Больная созналась, что имѣла привычное совокупленіе per anum. Два или три первые раза она испытывала жестокую боль; съ тѣхъ поръ содомія практикуется безъ болевыхъ ощущеній.

Воронка выражена весьма рѣзко; задній проходъ поднятъ кверху расширенъ и окруженъ множествомъ геморроидальныхъ шишекъ. Газы и калъ отходятъ непроизвольно. 15 дней тому

назадъ она стала чувствовать боль in ano, проявляющуюся особенно при испражненіяхъ и содоміи. На задней части прохода отысканъ мною затвердѣлый шанкръ.

Второй примѣръ относится тоже къ 28 лѣтней служанкѣ, поступившей въ госпиталь по причинѣ хроническаго метрита, сопровождаемаго двухстороннимъ аденолимфитомъ. По ея рассказамъ она предается 2 года содоміи, по причинѣ болѣзненности при естественномъ половомъ актѣ. Она тоже не можетъ удерживать кишечныхъ газовъ и испражнений, особенно, если присоединяется поносъ. — Раздвигая ягодицы, находимъ значительно выраженную воронку; она равняется длиною 3-мъ сантиметрамъ и производитъ на палецъ впечатлѣніе канала. На верхушкѣ воронки усматривается поднятое кверху заднепроходное отверстие. Оно очень расширено. Расширяя его еще болѣе пальцами, что легко достигается, мы видимъ влажную и синеватую слизистую оболочку кишки. Палецъ убѣждаетъ насъ, что сфинктеръ потерялъ свой тонусъ. Пройдя сфинктеръ, находимъ, что воронка продолжается и внутри кишки и направляется къ задней части матки.

Третій, наконецъ, касается 17 лѣтней дѣвушки, помѣщающейся на 19-ой кровати въ залѣ Saint-Alexis. Въ теченіи 4 мѣсяцевъ она предается содоміи со своими любовниками. Сначала актъ былъ труденъ и болѣзненъ, потомъ сталъ совершаться легко и безъ боли. Раздвигая ягодицы, видимъ отодвинутый къ верху задній проходъ; передъ нимъ — короткую воронку. Ощупывая, кромѣ расширенія anus'a, пропускающаго свободно два пальца, находимъ еще уменьшеніе тонуса сфинктера, поднятіе кверху заднепроходной области и изглаживаніе лучевыхъ складокъ прохода. Больная наша жалуется еще на невозможность удержать кишечные газы и испражненіе, особенно при поносѣ. — И такъ, заднепроходная воронка есть дѣйствительное явленіе; надо только умѣть отыскать ее и правильно сѣбѣ представить представляющіяся измѣненія.

Для этого я приведу точное описаніе заднепроходной воронки, сдѣланное профессоромъ А. Tardieu: „Заднепроходная воронка образуется съ одной стороны постепеннымъ отодвиганіемъ частей, лежащихъ впереди задняго прохода, съ другой — сопротивленіемъ, оказываемымъ верхнюю частію сфинктера, полному введенію полового члена *in anum*. Дѣйствительно, сфинктеръ образуетъ сверхъ задняго прохода родъ способнаго къ сокращенію мускульнаго канала, достигающаго иногда 3-хъ до 4-хъ сантиметровъ въ высоту. Такимъ образомъ, нижняя часть кольца можетъ уступить и быть отодвинутой къ верхней, которая сопротивляясь болѣе, образуетъ собою вершину воронки; широкая часть послѣдней составляется ягодицами, узкая идетъ кверху черезъ заднепроходное отверстіе до отодвинутой верхней части сфинктера, превращеннаго въ кольцо, болѣе или менѣе заширающее входъ въ кишку“.

„Если мнѣ удалось“, продолжаетъ знаменитый профессоръ, „сдѣлать это описаніе яснымъ, то вы должны себѣ представить что воронка будетъ болѣе или менѣе широка и глубока, смотря по полнотѣ или худобѣ субъекта, и смотря по большому или меньшему выступанію ягодицъ. У очень толстыхъ субъектовъ, имѣющихъ развитыя ягодицы, воронка часто отсутствуетъ, или, по крайней мѣрѣ, составляется только на уровнѣ сфинктера и при томъ изъ растяженія наружной его части; она очень коротка и можетъ быть замѣчена только при сильномъ раздвиганіи ягодицъ и задняго прохода. У очень худощавыхъ особъ, воронка тоже можетъ отсутствовать, потому что нижній край ягодицъ очень слабо выраженъ и поэтому нѣтъ вдавленія мягкихъ частей, и, во вторыхъ, потому, что *anus* или весьма поверхностно помѣщенъ, какъ это видимъ преимущественно у очень худыхъ женщинъ; или же находится на днѣ естественнаго углубленія, представляющаго воронкообразной формы. — Болѣе всего бываетъ выра-

жена воронка у недерастовъ съ умѣренной полнотою тѣла. У нихъ мягкія ягодицы отдавливаются отъ своей нижней поверхности до краевъ ані, образуя широкую воронку, суживающуюся болѣе или менѣе кверху у задняго прохода. Раздвиганіе ягодицъ легко обнаруживаетъ такую воронку“.

Я ничего немогу, Мм. Гг., прибавить къ этому классическому описанію заднепроходной воронки. Вы познакомились съ причинами и способами происхожденія воронки, а также съ условіями способствующими ея развитію, и вамъ теперь легко понять почему измѣненіе это не бываетъ постояннымъ; почему оно, само по себѣ, не можетъ служить патогностическимъ признакомъ совокупленія *per anum*. Но есть одинъ пунктъ относящійся къ содоміи у женщинъ и на который я долженъ обратить ваше вниманіе. Если вы не найдете у нихъ ни отодвиганія *anus'a* кверху, ни такой воронки, какая вамъ описана, не думайте, что ея вовсе нѣтъ. Во многихъ случаяхъ внимательное изслѣдованіе, посредствомъ ошупыванія пальцемъ задняго прохода, убѣдитъ васъ, что имѣется воронка, состоящая не изъ ягодицъ, но изъ самаго *anus'a* и его сфинктера, такъ что палецъ, направленный сзади впередъ и съ низу кверху, ощущаетъ своимъ концомъ маленькое круглое углубленіе въ формѣ чашечки. Такой характеръ углубленія очень важенъ и, если вы вспомните, мы его встрѣчали не разъ и даже сегодня у нѣсколькихъ больныхъ въ залѣ *Natalis-Guillot*. Призываю все ваше вниманіе на эту воронку, образуемую изъ одного задняго прохода, потому что, повидимому, никто изъ авторовъ ея не замѣчалъ.

Кромѣ воронкообразныхъ измѣненій, мы видимъ при содоміи, что сфинктеръ бываетъ ослабленъ и лучевыя складки ані изглажены. Эти два признака весьма важны для клинической оцѣнки признаковъ содоміи. Дѣйствительно, они не отсутствуютъ никогда при застарѣлой содоміи. Совершенно правильно *A. Tardieu*

выѣстъ съ Закхіемъ и Casper'омъ придаетъ важное діагностическое значеніе существованію означенныхъ двухъ признаковъ, встрѣчающихся, по его словамъ, даже и тогда, когда воронка отсутствуетъ. Я тоже всегда наблюдалъ расслабленіе сфинктера и изглаживаніе лучевыхъ складокъ. Легко понять, почему эти признаки такъ постоянны при застарѣлой содоміи: условія, необходимыя для ихъ развитія другія, чѣмъ для происхожденія воронки; тутъ нѣтъ надобности ни въ сопротивленіи сфинктера ни въ особомъ несоотвѣтствіи органовъ, нѣтъ дѣла до того, легко или трудно совершается заднепроходное совокупленіе; для происхожденія ихъ достаточно, чтобы актъ содоміи часто повторялся. Тренія, движенія члена достаточно для расслабленія сфинктера и изглаженія лучевыхъ складокъ. Поэтому то вы ихъ и встрѣтите всегда, если содомія стала привычной. Также какъ при нормальномъ совокупленіи тонусъ *constrictoris cunni* постепенно ослабляется и совокупленіе совершается легче, также, если я смѣю сдѣлать это сравненіе, и тонусъ *constrictoris ani* теряется мало по малу при содоміи, сфинктеръ незамѣтно ослабляется, складки изглаживаются, совокупленіе совершается легко.

Выѣстъ съ этими двумя болѣзненными признаками мы находимъ, раздвигая заднепроходное отверстіе пальцами, что кишечная слизистая оболочка образуетъ складки, иногда въ видѣ выдающагося, толстаго валика. Такія явленія часто встрѣчаются у женщинъ, давно предающихся содоміи, и преимущественно, у имѣющихъ страданіе половыхъ органовъ, затрудняющія нормальное соитіе. Что-же касается до наростовъ, называемыхъ латинскими сатириками *crista, mariscas* и считавшимся Закхіемъ за привычный знакъ содоміи, то я ихъ никогда не встрѣчалъ.

При означенныхъ измѣненіяхъ задняго прохода встрѣчаютъ еще утонченіе сфинктера, отодвиганіе *anus'a* кверху и расширеніе заднепроходнаго отверстія, такъ что больныя жалуются на

невозможность удержать калъ и кишечные газы. Вслѣдствіе такого расширенія задняго прохода, палецъ, два и даже три пальца, — легко проникаютъ въ прямую кишку. Раздвигая ягодицы, замѣчаютъ болѣе или менѣе зіющую дыру, дающую возможность наблюдать нѣкоторыя поврежденія слизистой оболочки, какъ-то, геморроидальныя шишки, свищи и т. под. Эти поврежденія, считаемыя Д-ромъ Venot (de Bordeaux) за слѣдствіе привычной застарѣлой содоміи, не могутъ имѣть такого значенія, судя по моимъ наблюденіямъ. За исключеніемъ воспалительныхъ явленій, слѣдовавшихъ за свѣжимъ стремительнымъ и насильственнымъ совокупленіемъ, я никогда не замѣчалъ ни свищей ни геморроя у моихъ пациентовъ.

Эти болѣзни являютъя помимо застарѣлой содоміи; они могутъ совпадать съ ней, но не составляютъ собой ея послѣдствія.

Содомія соутетвуется весьма часто заразительными болѣзнями, каковы: мягкій и твердый шанкры и трипперъ.

Въ этомъ отношеніи слизистая оболочка апі гарантирована не болѣе влагалищной. Причиною зараженія служитъ совокупленіе. Такимъ образомъ, существованіе этихъ заболѣваній въ нормальномъ мѣстѣ, очень часто подтверждаетъ діагностику содоміи (A. Tardieu). Со времени изданія труда одного изъ моихъ интерновъ, Г-на Binet (въ 1881 году), содержащаго пять наблюденій о шанкрахъ задняго прохода, мнѣ встрѣтилось еще около 20 такихъ случаевъ. И всегда, и твердые, и мягкіе шанкры развивались отъ совокупленія per anum.

Если этотъ актъ (совокупленіе) есть обыкновенная причина сифилитическаго зараженія апі, то бываютъ и исключенія: мягкіе и твердые шанкры апі могутъ происходить отъ другаго источника заразы.

Но жаль
шанкеры. я
стнѣ, послужи
дого шанкра
ного прохода
любоникъ ко

Что кас
какъ легко са
что присутств

Для пр
вильно оцѣни
равно какъ

Что ка
рѣдокъ. Онъ
Въ этомъ го
клинически
gesti, а так
дло и само
вождалось н
признаки не
именно три

Въ на
больной въ
сивные поде
особую пох
найдете ни

У нея
торыя А. Т

Но желая упоминать о всѣхъ причинахъ появленія этихъ шанкеровъ. я не могу умолчать объ одномъ развратномъ дѣйствіи, послужившемъ, по моимъ наблюденіямъ, причиною твердаго шанкра задняго прохода, я говорю о дотрогиваніи до задняго прохода языкомъ. Это было у одной молодой женщины, любовникъ которой имѣлъ языкъ, покрытый сифилидами.

Что касается мягкихъ шанкеровъ. то достаточно вспомнить какъ легко самозараженіе ими (*autoinoculatio*). чтобы признать что присутствіе ихъ *in ano* не всегда бываетъ признакомъ содоміи.

Для прочнаго установленія факта содоміи, необходимо правильно оцѣнить предшествовавшіе ей причинныя обстоятельства, равно какъ и характеристическія измѣненія *anus'a*.

Что касается заднепроходнаго тришера, то онъ крайне рѣдокъ. Онъ одинъ разъ замѣченъ профессоромъ А. Tardieu. Въ этомъ году вы видѣли второй случай. характеризовавшійся клинически краснотою, набуханіемъ слизистой оболочки *apі* и *gecti*, а также —слизисто-гнойнымъ истеченіемъ. которое выходило и само по себѣ и при подавливаніи *anus'a*, и не сопровождалось ни язвами ни фистулами.—Всѣ эти вмѣстѣ взятые признаки неоставляли никакого сомнѣнія, что передъ нами былъ именно тришерь задняго прохода.

Въ настоящее время вы можете наблюдать третій случай у больной въ нашемъ отдѣленіи. Вы знаете, что по Tardieu, пассивные педерасты изъ мужчинъ имѣютъ своеобразную наружность, особую походку и характеристическіе вкусы. У женщины вы не найдете ничего, способнаго указать на содомію.

У нея вы также не найдете тѣхъ измѣненій здоровья, которыя А. Tardieu наблюдалъ у педерастовъ.

Именно, вы не замѣтите ни этаго жалкаго вида, ни болѣзненной блѣдности, ни истощенія физическихъ и нравственныхъ силъ, словомъ, никакихъ признаковъ свойственныхъ пассивнымъ недерастамъ.

По этому только измѣненію задняго прохода могутъ служить у женщины признакомъ содоміи. Понятно, что врачу необходимо точно изслѣдовать заднепроходную область и тщательно оцѣнить все существующіе признаки, прежде чѣмъ принять, или отвергнуть содомію. Если-бы, не смотря на весь талантъ и все остроуміе эксперта, а также на всю клиническую его ловкость, -- онъ колебался дать заключеніе, особенно, если дѣло идетъ о судебно-медицинскомъ случаѣ; -- то врачъ обязанъ изложить свои сомнѣнія, точно формулируя причины пренятствующія ему придти къ яеному и несомнѣнному убѣжденію о фактѣ. Лучше показаться несвѣдующимъ и не уличить виновнаго, чѣмъ послужить поводомъ къ опороченію чести и даже къ обвиненію невиннаго. -- Вообще діагностика признаковъ содоміи легка, но бываютъ случаи, когда она крайне затруднительна. Дѣйствительно, имѣется много источниковъ ошибокъ. Одни изъ нихъ происходятъ отъ трудности изслѣдованія; другіе отъ врожденныхъ или пріобрѣтенныхъ аномалій, нарушающихъ нормальное строеніе частей и затемняющихъ признаковъ содоміи. Такъ, больныя моего отдѣленія обыкновенно не пренятствуютъ изслѣдованію задняго прохода и легко сознаются въ содоміи, но мнѣ случалось встрѣчать между ними женщинъ, старавшихся скрыть свой порокъ и затруднить осмотръ ані. Подобно недерастамъ, такія женщины стараются скрыть характерные слѣды порока, онѣ отрицаютъ, вопреки очевидности, свои привычки къ содоміи. Онѣ сжимаютъ лгодицы, пренятствуютъ ихъ раздвиганію, а слѣдовательно и отыскиванію воронки и константированію поднятія сфинктера. Сокращенія эти ведутъ иногда къ удлинненію, или

даже къ искус-
ращенія инус-
прощенъ, вра-
постѣдней на
ничего легче,
ставить женщи-
долгимъ осмот-
мускульное со-
заднепроходно-
женъ убѣдиг-
мельшемъ со-
или менѣе въ

Нѣкото-
пріобрѣтенны
существовані
долженъ смѣ-
бывающихъ
цовъ отъ п-
можность о-
ваетъ единс-
но и тогда
ствованіе п

Такой
Если не в-
діагностич-
константи-
наблюдаем-
сфинктера
зовъ и ка-
хода. Что
верѣдко от

даже къ искусственному воспроизведенію воронки, вслѣдствіе сокращенія *musculi levatoris ani* (Brouardei). Не будучи предупрежденъ, врачъ можетъ счесть это за признакъ содоміи (хотя послѣдней на самомъ дѣлѣ нѣтъ) и совершить ошибку. Но нѣтъ ничего легче, какъ избѣжать такой ошибки: стоитъ только заставить женщину перемѣнить быстро свою позу, или утомить ее долгимъ осмотромъ, словомъ примѣнить все, способное прекратить мускульное сокращеніе. Последнее вскорѣ уступаетъ и осмотръ заднепроходной области становится легкимъ. Тогда врачъ долженъ убѣдиться въ силѣ тонуса сфинктера, въ большемъ или меньшемъ сопротивленіи его введенію пальца, а также въ болѣе или менѣе выраженномъ расширеніи задняго прохода.

Нѣкоторые источники ошибокъ лежатъ въ природныхъ или приобрѣтенныхъ особенностяхъ субъекта. Зная о возможности ихъ существованія, не трудно избѣжать ошибокъ. Такъ, врачъ не долженъ смѣшивать съ признаками содоміи, — вылитыхъ ягодицъ, бывающихъ у стариковъ, свищей задняго прохода, геморроя, рубцовъ отъ прежнихъ операцій. Точный осмотръ устраняетъ возможность ошибокъ. Последнія возможны только если содомія бываетъ одновременно съ однимъ изъ означенныхъ поврежденій, но и тогда изслѣдованіе этиологіи, признанія больныхъ, существованіе признаковъ содоміи, — облегчаютъ діагнозъ.

Таково, Мм. Гг., значеніе діагностическихъ данныхъ содоміи. Если не всѣ изъ разнообразныхъ признаковъ имѣютъ одинаковую діагностическую важность, то между ними встрѣчаются такіе, константированія, которыхъ достаточно для правильной оцѣнки наблюдаемыхъ измѣненій. Я говорю специально о расслабленіи сфинктера, потери его тонуса, о непроизвольномъ выдѣленіи газовъ и кала, о изглаживаніи лучевыхъ складокъ задняго прохода. Что касается заднепроходной воронки, то признакъ этотъ верѣдко отсутствуетъ, по причинамъ уже вамъ извѣстнымъ.

Но если къ вышеизложеннымъ явленіямъ, присоединится еще воронка, то она имѣетъ очень важное діагностическое значеніе. Тогда не можетъ быть сомнѣнія въ причинѣ заднепроходныхъ измѣненій.

Констатированіе заразительнаго заболѣванія *in ano* подтверждаетъ еще болѣе діагностику.

Я, можетъ быть, слишкомъ долго останавливался на діагностикѣ измѣненій *anus'a* отъ содоміи, но это имѣло, Мм. Гр., цѣлью — дать вамъ возможность узнать и оцѣнить ихъ надлежащимъ образомъ, а также отвѣтить критикамъ моего глубоко-уважаемаго учителя, А. Tardieu. — Надѣюсь, что мнѣ удалось подтвердить возрѣнія моего учителя и убѣдить васъ въ дѣйствительномъ существованіи въ заднемъ проходѣ признаковъ содоміи.

Что касается послѣдствій содоміи, то отмѣтивъ при симптоматологіи параллелію, потерю тонуса сфинктера, непроизвольное выдѣленіе газовъ и кала, воспаленіе и травматическія поврежденія слизистой оболочки *ap'i*, заднепроходные абсцессы, фистулы, заразительныя болѣзни, — я достаточно указалъ, что совокупленію *per anum* не лишено опасности. Если содомія часто даетъ поводъ къ отравительному недугу (недержание кала), то иногда она можетъ быть причиною тяжелыхъ заболѣваній, на-прим. суженія прямой кишки.

Наконецъ, неслѣдуетъ забывать, что она можетъ обусловить тяжелые нервныя припадки; достаточно вспомнить о параллеліи, о которой не разъ была уже рѣчь.

По всемъ этимъ причинамъ, мы обязаны, Мм. Гр., внимательно слѣдить за поврежденіями, зависящими отъ свѣжей, или застарѣлой содоміи и лѣчить ихъ, смотря по ихъ воспалительному, конституціонному, или специфическому свойству.

Оканчивая
в содоміи я с
ваше благоскло
наука, но смот
ны, имѣетъ д
важныхъ соціо
и потому, что
ній, или въ о
органахъ. В
рецидивовъ ма
причинамъ я
васъ съ выше

Позволь
трактуемаго
стороны, выс
денія и прог
слѣдствій оз
ную благопр

Оканчивая изученіе признаковъ опанізма, сифизма, растленія и содоміи я считаю долгомъ благодарить васъ, Мм. Гг., за ваше благосклонное и постоянное вниманіе. Вы поняли, что наша паука, не смотря на нѣкоторыя свои непривлекательныя стороны, имѣетъ для врача высокій интересъ, не только по причинѣ важныхъ соціологическихъ задачъ, которыя она поднимаетъ, но и потому, что она даетъ объясненіе разныхъ глубокихъ измѣненій, или въ организмѣ женщины вообще, или въ ея половыхъ органахъ. Въ ней-же мы находимъ разгадку столь частыхъ рецидивовъ маточно-влагалищныхъ заболѣваній. По всемъ этимъ причинамъ я считалъ своей прямой обязанностію познакомить васъ съ вышеизложеннымъ.

Позвольте мнѣ надѣяться, что я не оказался много ниже трактуемаго предмета и что, несмотря на многія скабрёзныя стороны, выступающія поневолѣ при изученіи условій происхожденія и прогрессированія, а также клиническаго теченія и послѣдствій означенныхъ привычекъ,—я сумѣлъ соблюсти возможную благопристойность рѣчи.

Введеніє .
Причини вульварі
Причини сифізм
Анатомія паружв
Измѣненія полов
Клиническія свої
Измѣненія полов
Клиническія явл

—
Поврежденія вс
Общія явленія
Какъ помогать
Измѣненія поло
Этіологическія
Клиническое св
Признаки прос
Измѣненія зад
Причины .
Клиническія я
Содомія свѣжа
— привы
Діагностика со
Послѣдствія со
Заключеніє.

О Г Л А В Л Е Н І Е.

	СТРАН.
Введеніє	1
Причины вульварныхъ и заднепроходныхъ измѣненій .	5
Причины сафизма	9
Анатомія наружн. женск. половыхъ органовъ . .	16
Измѣненія половой щели отъ онанизма . . .	23
Клиническія свойства этихъ измѣненій . . .	25
Измѣненія полов. органовъ женщины отъ рукоблудія .	26
Клиническія явленія при онанизмѣ бедрами . .	28
— — сафизма.	30
Поврежденія вслѣдствіе сафизма	32
Общія явленія при онанизмѣ	—
Какъ помогать при онанизмѣ	34
Измѣненія половой щели отъ растленія . . .	36
Этіологическія условія	39
Клиническое свойство измѣненій	41
Признаки проституціи	43
Измѣненія задняго прохода отъ содоміи . . .	48
Причины	—
Клиническія явленія	59
Содомія свѣжая	64
— привычная	66
Діагностика содоміи	74
Послѣдствія содоміи	76
Заключеніе.	—

Книга изготовлена по технологии
print-on-demand (печать по требованию)


ISBN 978-5-4481-0105-2



9 785448 101052

RESIDENT EVIL 4

CAPCOM







ЖЕНЩИНА И ЕЕ РАБОТА

ЧУПАЛА ЗАКАЗЫВАЛИ?

ЖЕНЩИНА И ЕЕ РАБОТА





Активация Windows

Чтобы активировать Windows, перейдите в раздел "Параметры".





Simple.gg/rtthrowgame




runade ouz piz nora
mcrnagom en liva!


RT THROW







Погляните в Бистро ИКЕА
Хот-дог
29.-



Ряды
27, 29

Экспресс-кассы

11-15, 17
Для покупателей с 10 товарами


Кассы
ИКЕА Сервис
Выход

31
07
ТОДАЛЕН
ТОДАЛЕН
2 299


31
30
МАЛА
МОЛА
1 499.-












RT THROW







241 - 500 MB





Measures Weapons Recovery Map Hints Exit



Resident Evil 4 Speedrun PC - No Merchant

Resident Evil 4 Speedrun
No Merchant 600 2500

LABRINTO	1:00:00	1:00:00
QUARTO ADA	1:00:00	1:00:00
SANCTUARY	1:00:00	1:00:00
ALAYRINO	1:00:00	1:00:00
ASHLEY	1:00:00	1:00:00
ALAYANCA	1:00:00	1:00:00
PUZZLE	1:00:00	1:00:00

VOLTANDO	1:00:00	1:00:00
FINAL	1:00:00	1:00:00

41:04.99

File: 01.01
Size: 02.01
Possible Time Save: 0.00
Sum of Best Segments: 0.00
Previous Segment: 0.00



Ashley



Лучшая подписка* в Сбере

* Лучшая среди продуктов на sber.ru по совокупности предоставляемых бонусов и скидок. Тарифный план от ПАО Сбербанк (далее — «ТП») — стоимость на набор продуктов услуг с указанием их перечня и условий предоставления (размера плат и/или иных условий), доступный для подключения в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» (0+). Подробнее об условиях предоставления ТП и продуктах услугах в него входящих, имеющихся ограничениях и иных условиях — на <https://sberprime.sber.ru/plus>. ПАО Сбербанк Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.









For you

LOVE

OPEN

point

hello

Sugar

LOVE

PIC-COLLAGE

HUSTLER OF THE YEAR CINDY STARFALL: HOW TO BE A PORN STAR

HUSTLER

HARDCORE SINCE '74

DECEMBER 2016

COVER HONEYS
**JESSA RHODES &
VANESSA VERACRUZ**

**MASS
SHOOTINGS**
AN ALL-AMERICAN
EPIDEMIC

VISIT A STRIP
CLUB WITH
**KURT
VONNEGUT**

DECEMBER 2016 \$12.99 U.S.



HUSTLERMAGAZINE.COM

WARNING: Material is of an adult nature. This is not a children's publication. No part of this publication may be reproduced without permission. All rights reserved. © 2016 Hustler Magazine, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S.A.


TOP DAMAGE!
DAME: 510,351.34 DM

1267



TOP DONATOR:
1019.75499 BUB

1262



神志




This Fight Ended With A NASTY Rear-Naked Choke 🚫













РАБОТАЙ
РЯДОМ С ДОМОМ

Ленинский проспект

Т. о. изд. Гагарина

ТУАЛЕТ





T

wa







МОСКОВСКИЙ
ТЕАТР
МЮЗИКЛА
10 СЕЗОН


ЮБИЛЕЙНЫЙ
СЕЗОН

ПРАЙМ ТАЙМ



МЮЗИКЛ

с 5
ДЕКАБРЯ









GAME

禁忌遊戲

SCORE

01572

RATIO

81%

TIME

026



















This Fight Ended With A NASTY Rear-Naked Choke 🚫






Leia o código com a
câmera do celular.

Weapons Recovery Map Files etc

OPTAS



Move selection

Ashley







МОСКОВСКИЙ
ТЕАТР
МЮЗИКЛА
10 СЕЗОН

ЮБИЛЕЙНЫЙ
СЕЗОН

ПРАЙМ ТАЙМ



МЮЗИКЛ

с 5
ДЕКАБРЯ



Подарки
ко дню всех
влюбленных!



СКИДКИ

18.18

199

199

199

199

349

349

199

199







OK
МОЛОЧНАЯ
КУХНЯ

МНОГО
ОБУВИ

...***EBM***

BRANDSTÄTTER

obst • gemüse • e+c • lebensmittelgrossmarkt • wein

+43 (0) 3532-2474 • office@ebm-murau.at







The
RETRO
Wave






© 2016 Capcom. All Rights Reserved.













STREET FIGHTER V: Chun Li Gets Washed






















LA BLUE GIRL
ABRIDGED





[Redacted]

Just thought you should know that there exists a book titled, "Disco Bloodb

We need that book!

Is it about last Friday night, by any chance?

How can you make me smile about such a hideous moment??? Yes, it is...
fucking love you, you cunt!!!

[Redacted]



SUBSCRIBE TO THE LAW&CRIME NEWSLETTER FOR DAILY CASE UPDATES

[LINK IN VIDEO DESCRIPTION >](#)

а я не собираюсь повторить остальную часть,
не

#JohnnyDepp #AmberHeard

Johnny Depp Believed Amber Was Having an Affair Due To Owning a Painting Heard Says

27 509

👍 363

👎 НЕ
НРАВИТСЯ

🔗 ПОДЕЛИТЬСЯ

✂ СОЗДАТЬ КЛИП

⌵ СОХРАНИТЬ

...

📺 ВИДЕО



Johnny Depp: Amber Heard refused to give meds during...



**ВСЕГДА
не верьте
тому что
кажется,
верьте
ТОЛЬКО
доказательствам.**



PIC•COLLAGE

Чарльз Диккенс. «Большие надежды» 1861 г.